

籠ノ登山(東西)、水ノ塔山
及び浅間外輪山の植物
〔2年目〕

籠ノ登山（東西）、水ノ塔山及び浅間外輪山の植物 〔2年目〕

調査者 植 物 大平 満、大森 威宏、片野 光一、鈴木 伸一、
蛭間 啓、吉井 広始

1 地域の概況

吾妻郡嬭恋村の地蔵峠（1772m）から西籠ノ登山（2212m）、東籠ノ登山（2227.9m）、水ノ塔山（2227.9m）、車坂峠（1973m）を経て、浅間山の外輪山であるトーミの頭（2320m）、黒斑山（2404m）、蛇骨岳（2366m）、鋸岳（2319.7m）に至る長野県との県境稜線の群馬県側には、一部を除きほとんど手つかずの自然植生が広く残されている。しかし、この地域の植生・植物相の全体像が分かるような学術的な調査はほとんどなされていない。良好な自然環境を有する地域学術調査として、1978年度に「黒斑山地域」（須藤・片野 1979）、2005年度に「湯の丸高原（植物）」（松澤ほか 2006）が行われているが、黒斑山の植生・植物相の概要、東籠ノ登山から西籠ノ登山にかけての稜線部と西籠ノ登山北面の植生・植物相が記されているだけである。なお、本地域一帯は上信越高原国立公園に指定されており、群馬県側は黒斑山西面の国有林以外は民有地となっている。

本地域は、浅間・烏帽子火山群の東部に位置し、黒斑山などでは浅間山の火山活動による自然変化が将来生じるおそれがある。また、調査対象地域を含む高峰高原は、小諸市から車坂峠までのチェリーパークライン、車坂峠と地蔵峠を結ぶ湯の丸高峰併用林道（冬期閉鎖）が整備され、車坂峠近くにはアサマ2000パークのスキー場があるため、一年を通じて観光・登山・レクリエーション等の場として多くの人々が訪れるが、さらに観光開発が進む可能性がある。特に、春から秋にかけては、登山者を含む観光客が多い。また、近年、長野県側からニホンジカが侵入し、食害等の植生攪乱が報告されるようになってきている。

本調査は、このような状況を踏まえ、亜高山針葉樹林や火山荒原を有する本地域の植物相と植生の実態を把握するために行うものであり、今年度は2年計画の調査の2年目にあたる。調査対象地域を図1-1に示した。



図1-1 籠ノ登山（東・西）、水ノ塔山及び浅間外輪山の植物調査対象地域（電子国土Web地理院地図に加筆）

調査にあたって、株式会社アサマリゾート、上信越高原国立公園管理事務所、吾妻森林管理署には、多くの便宜を図っていただいた。ここに記し、心より感謝いたします。

引用文献

須藤志成幸・片野光一（1979）植生（黒斑山地域）．良好な自然環境を有する地域学術調査報告書，6：100-103．群馬県林務部林業経営課．

松澤篤郎・須藤志成幸・津久井芳雄・青木雅夫・石川真一・大森威宏・増田和明（2006）湯の丸高原（植物）．良好な自然環境を有する地域学術調査報告書，31：249-260．群馬県自然環境課．
（吉井 広始・片野 光一）

2 植 物

(1) 調査の概況

調査対象としたのは、浅間・烏帽子火山群の東部に位置する浅間山外輪山（鋸岳（2254m）から黒斑山（2404m）を経てトーミの頭まで）から高峯山（2106m）、水ノ塔山（2202m）、東麓ノ登山（2227.9m）、西麓ノ登山（2212m）にかけての群馬県側で、上信越高原国立公園内に位置する。なお、黒斑山西面は国有林であるが、その他は民有地である。

植生・植物相の調査は以下の日程と経路で行われた。

2021年 6月29日：高峰温泉から水ノ塔山・東麓ノ登山・西麓ノ登山〔植物相調査：吉井〕

6月30日：車坂峠からトーミの頭・黒斑山〔植生・植物相調査：吉井・大平・片野〕

7月 7日：池ノ平駐車場から東麓ノ登山・西麓ノ登山〔植物相調査：大平〕

8月 5日：池ノ平駐車場から東麓ノ登山・西麓ノ登山〔植物相調査：大平〕

8月24日：高峰温泉から水ノ塔山・東麓ノ登山〔植生・植物相調査：吉井・大平・片野〕

8月25日：車坂峠周辺・高峯山・黒斑山〔植物相調査：吉井・大平〕

2022年 7月27日：池ノ平駐車場から東麓ノ登山・西麓ノ登山〔植生・植物相調査：吉井・鈴木・大平〕

7月28日：車坂峠から蛇骨岳・仙人岳・鋸岳〔植生・植物相調査：吉井・大平・片野〕

8月16日：車坂峠から高峯山〔植物相調査：大平〕

9月10日：車坂峠からトーミの頭・黒斑山・蛇骨岳・仙人岳・鋸岳〔植生・植物相調査：吉井〕

植生調査は、Braun-Blanquet（1964）の植物社会学的方法を用い、群落組成表による群落類型区分を行った〔鈴木〕。植物相については、採取した標本をもとに維管束植物目録を作成した。調査ルート及び植生調査地点を図2-1に示した。



図2-1 植物相調査ルート及び植生調査地点（電子国土Web地理院地図に加筆）

(2) 植生

ア 植生概要

(ア) 気候と地形・地質

調査対象地域の浅間・烏帽子火山群周辺は、内陸的な気候（中央高地式気候）の影響を受ける寒冷で寡雪な地域である。丸山（1987）によると、最深積雪は50～100cm程で、年降水量は1800mm以下、冬期降水量は150～200mmであり、温量指数は黒斑山（2414m）がWI（暖かさの指数）＝

3m.d.、CI（寒さの指数）＝－61m.d.、東麓ノ登山（2227.9m）がWI＝13m.d.、CI＝－56m.d.である。

黒斑山は約10万年前以降に成長を開始し、約2.3万年前の大規模な山体崩壊を経て、約2.1万年前に火山活動を終了した成層火山（<https://www.gsj.jp/hazards/volcano/asama/2004/history.html>）で、浅間山の第一外輪山となっている。また、西来ほか（2013）によると、高峯山と水ノ塔山はそれぞれ約30万年前、13～10万年前に形成された成層火山、西麓ノ登山と東麓ノ登山は約8万年前に形成された溶岩ドームである。

調査対象地域の地質は、荒牧（1993）によると、車坂峠付近より東側が黒斑山中部層（三ッ尾根グループ）の溶岩流・凝灰角礫岩・固結しない火砕物（普通輝石紫蘇輝石安山岩）、西側が烏帽子火山噴出物の溶岩流・凝灰角礫岩・固結しない火砕物（普通輝石紫蘇輝石安山岩）である。

（イ）植生概要

現地調査した範囲は、最低標高が高峰温泉付近の約1940mで、すべてコケモートウヒクラス域（亜高山針葉樹林域）に位置する。かつては、亜高山針葉樹林に広く覆われていたと思われるが、車坂峠（1973m）から高峰温泉（1950m）にかけての北側は、アサマ2000パークのスキー場となっている。黒斑山西面の標高約2050m（ところによって1950m）以上、水ノ塔山から西麓ノ登山にかけての東面や北面の山腹斜面には、シラビソ・オオシラビソ群集（図2-2）が広がっている。オオシラビソを伴わない林分が多く、オオシラビソは標高の高い地域の尾根部登山道脇など雪が吹き溜まりやすい部分などにみられる。なお、黒斑山では一部に縞枯れが認められるほか、代償植生として小面積のダケカンバ優占植分がある。黒斑山西面や水ノ塔山東面ではシラビソ・オオシラビソ群集下部の緩傾斜地には、本地域を特徴づけるカラマツ群落分布する。黒斑山西面のカラマツ林は、75.8haが林野庁の「黒斑山天然カラマツ植物群落保護林」として指定されている。なお、先駆的傾向の強いカラマツは、仙人岳山頂北東などでは低木林となっている（図2-3）。東・西麓ノ登山や水ノ塔山、黒斑山の岩角地や急斜面にはアカミノイヌツゲ・クロベ群集（図2-4）が分布するが、黒斑山登山道中コースなどではコメツガの優占する林分となっている。蛇骨岳（2366m）北側2340m付近から鋸岳に至る稜線の北斜面上部にはミヤマハンノキの低木群落が見られ（図2-5）、下部でシラビソ・オオシラビソ林に接している。なお、水ノ塔山南東面やアサマ2000パークスキー場北などは、カラマツ植林地となっている。

風衝の強い浅間外輪山や水ノ塔山、東・西麓ノ登山の稜線部の岩角地には、矮性低木群落分布する。ガンコウラン群落やコメバツガザクラ・ミネズオウ群集（図2-6）、ウラシマツツジ・クロマメノキ群集が多くみられるほか、トミの頭にはチョウジコメツツジ群集、水ノ塔山南尾根などにはツガザクラ群落分布する。

火山礫地の群落としては、浅間外輪山や水ノ塔山にオンタデ群落（図2-7）、蛇骨岳や水ノ塔山、東麓ノ登山にイタドリ群落、仙人岳（2319.7m）や東麓ノ登山にコメススキ群落、黒斑山や西麓ノ登山にグンバイヅル群落、水ノ塔山にイワインチン群落やミヤマニガイチゴ群落分布する。また、水ノ塔山山頂部の岩隙にはヒメスゲ群落が生育する。

東麓ノ登山山頂部などの風衝地には、ニッコウザサ群落などの自然生または代償植生のササ草原がみられる。

（ウ）その他

調査対象とされた地域一帯は、地表面が固結しない火砕物に覆われている部分が多いため、登山者の踏みつけなどに起因する植生破壊や表土の流出が起こりやすい。黒斑山の中コース登山道上部は、降水時の流路となるため洗掘が顕著で、人の背丈以上に抉られた部分も認められるようになっている。外輪山の稜線部でもトミの頭周辺など各所に比較的大きな人為裸地があり、降水時の洗掘などによって大きく抉られている部分もみられる（図2-8）。東麓ノ登山山頂周辺は、登山者の踏みつけによって大礫の多い裸地が広がり、植生は小さな島状に残されているだけである。

なお、高峰高原周辺は、近年、長野県側から侵入したニホンジカ（以下、シカによる植生攪乱が認められるようになっている。今回の調査においても、シカが頻繁に目撃され、コメツツジ、ズミ、ベニサラサドウダン、ミネズオウ、オオバスノキなど多種にわたって顕著な食害が確認された（図2-9）。今後の植生被害の拡大が懸念される。



図2-2 シラビソーオオシラビソ群集（蛇骨岳）



図2-3 カラマツ群落（仙人岳）



図2-4 アカミノイヌツゲークロベ群集（西籠ノ登山）



図2-5 外輪山稜線部のミヤマハンノキ群落。
手前は矮性低木群落（仙人岳－鋸岳間）



図2-6 コメバツガザクラミネズオウ群集（仙人岳）



図2-7 外輪山稜線部に点在するオンタテ群落（鋸岳）



図2-8 大きく抉られた稜線部の登山道（仙人岳西）



図2-9 シカの食害によって上部の枝葉を失ったオオバスノキ（黒斑山）

イ 植生調査

植生調査は、浅間外輪山、水ノ塔山、東・西麓ノ登山の森林や低木・草本群落など77箇所を実施した。植物社会学的な植生単位の検討を行った結果、以下に示す5群集13群落の基本的植生単位が区分された（表2-2～2-4）。なお、群落組成表の維管束植物の学名は「植物和名一学名インデックス YList」（米倉・梶田 2003-）、コケ植物の学名は「日本の野生植物コケ」（岩月編 2001）によった。

引用文献

- 荒牧重雄（1993）浅間火山地質図，地質調査所，
Braun-Blanquet, J. (1964) Pflanzensoziologie, Grundzüge der Vegetationskunde. 3 ed. Springer-Verlag, 865pp. Wien and New York.
岩月善之助編（2001）日本の野生植物コケ，560pp. 平凡社，
丸山定利（1987）2. 群馬県の気候，群馬県植物誌改訂版，17-32，群馬県，
西来邦章・高橋 康・松本哲一（2013）浅間・烏帽子火山群の火山活動場の変遷，地質学雑誌，119：474-487，
米倉浩司・梶田 忠（2003-）「BG Plants和名一学名インデックス」（YList），<http://ylist.info>（2023年2月27日），
吉井広始・片野光一・鈴木伸一（2022）植生（麓ノ登山（東西）、水ノ塔山及び浅間外輪山〔1年目〕，良好な自然環境を有する地域学術調査報告書，48:31-37，群馬県環境森林部自然環境課，
（吉井 広始・鈴木 伸一・片野 光一）

表2-1 植物群落目録

コケモートウヒクラス (亜高山針葉樹林) <i>Vaccinio-Piceetea</i> Br.-Bl. 1939
シラビソートウヒオーダー <i>Abieti-Piceetalia</i> Miyawaki <i>et al.</i> 1968
オオシラビソ群団 <i>Abietion mariesii</i> Suz.-Tok. 1954
シラビソ-オオシラビソ群集 <i>Abietetum veitchio-mariesii</i> Maeda 1958 (表2-2)
カラマツ群落 <i>Larix kaempferi</i> community (表2-2)
ブナクラス (夏緑広葉樹林) <i>Fagetea crenatae</i> Miyawaki, Ohba <i>et</i> Murase 1964
キタゴヨウオーダー <i>Pinetalia pentaphyllae</i> Suz.-Tok. 1966
シャクナゲークロベ群団 <i>Rhododendro-Thujion standishii</i> Miyawaki <i>et al.</i> 1968
アカミノイヌツゲークロベ群集 <i>Ilici-Thujetum standishii</i> Yamazaki <i>et</i> Nagai 1960 (表2-2)
ダケカンパーミヤマキンボウゲクラス (亜高山広葉樹林および広葉草原) <i>Betulo ermanii-Ranunculetea acris japonici</i> Ohba 1968
オオバタケシマラン-ミヤマハンノキオーダー <i>Streptopo-Alnetalia maximowiczii</i> Ohba 1973
ミドリユキザサ-ダケカンバ群団 <i>Smilacino yesoensis-Betulion ermanii</i> Ohba 1973
ダケカンバ群落 <i>Betula ermanii</i> community (表2-2)
ミヤマハンノキ群落 <i>Alnus viridis</i> ssp. <i>maximowiczii</i> community (表2-2)
コメツツジ-ハコネコメツツジクラス (岩角地低木群落) <i>Rhododendreteia tschonoskii-tsusiphylli</i> Ohba 1973
コメツツジ-ハコネコメツツジオーダー <i>Rhododendretalia tschonoskii-tsusiphylli</i> Ohba 1973
ツガザクラ群団 <i>Phyllodocion nipponicae</i> Miyawaki <i>et al.</i> 1968
チョウジコメツツジ群集 <i>Rhododendretum tschonoskii tetrameri</i> (表2-3)
ツガザクラ群落 <i>Phyllodoco nipponica</i> community (表2-3)
エイランタイ-ミネズオウクラス (高山風衝矮生低木群落) <i>Cetrario-Loiseleurietea</i> Suz.-Tok. <i>et</i> Umezu 1964
コメバツガザクラオーダー <i>Arcterietalia</i> Suz.-Tok. <i>et</i> Umezu 1964
コメバツガザクラ群団 <i>Arcterion</i> Suz.-Tok. <i>et</i> Umezu 1964
コメバツガザクラ-ミネズオウ群集 <i>Arcterico-Loiseleurietum procumbentis</i> Ohba <i>ex</i> Suz.-Tok. 1964 (表2-3)
ガンコウラン群落 <i>Empetrum nigrum</i> var. <i>japonicum</i> community (表2-3)
ウラシマツツジ-クロマメノキ群集 <i>Arctoo-Vaccinietum uliginosi</i> Yamazaki <i>et</i> Nagai 1961 (表2-3)
コマクサーイワツメクサクラス (高山荒原植物群落) <i>Dicentro-Stellarietea nipponicae</i> Ohba 1969
コバノツメクサオーダー <i>Minuartietalia verna japonicae</i> Ohba 1968
イワツメクサ群団 <i>Stellariion nipponicae</i> Ohba 1969
オンタデ群落 <i>Aconogonon weyrichii</i> var. <i>alpinum</i> community (表2-4)
コメスキ群落 <i>Avenella flexuosa</i> community (表2-4)
ゲンバイツル群落 <i>Veronica onoei</i> community (表2-4)
イワインチン群落 <i>Chrysanthemum rupestre</i> community (表2-4)
イタドリ群落 <i>Fallopia japonica</i> community (表2-4)
上級単位未決定
ミヤマニガイチゴ群落 <i>Rubus subcrataegifolius</i> community (表2-4)
ヒメスゲ群落 <i>Carex oxyandra</i> community (表2-4)
ニッコウザサ群落 <i>Sasa nana</i> community (表2-4)

表2-2 森林群落 (1)

1. Abietetum veitchio-mariesii a. Fcies with Sasa chartacea var. nana 2. Illici-Thujetum standishii		シラビソ-オオシラビソ群集 ニッコウザサファシス アカミノヌツグ-クロベ群集		3. Larix kaempferi community 4. Betula ermanii community 5. Alnus viridis ssp. maximowiczii community		カラマツ群落 ダケカンバ群落 ミヤマハンノキ群落																																					
Vegetation unit	植生単位	<table><tr><td colspan="2">a</td><td colspan="7">1</td><td colspan="5">2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td></tr></table>								a		1							2					3	4	5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
a		1							2					3	4	5																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17																											
Column no.	通し番号	2021	2021	2021	2021	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022																											
Stand number	調査番号	28	20	06	08	13	34	4	6	7	12	24	25	01	16	03																											
Date of relevé	調査年月日	2021	2021	2021	2021	2022	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2021	2022																											
		08	08	06	06	06	7	7	7	7	08	08	06	08	06	7																											
		24	24	30	30	30	28	27	27	27	24	24	30	24	30	28																											
latitude・longitude		2170	2060	2040	2255	2400	2340	2215	2150	2205	2185	2200	2185	1990	1980	2030																											
Slope direction	方位	NW	SW	SW	W	NW	E	N	NW	-	NW	NW	N	NE	SE	NW																											
(°)		40	10	30	-	60	-	-	30	-	20	10	-	25	20	80																											
Slope inclination(°)	傾斜	25	15	30	10	25	25	30	10	-	10	10	30	50	10	15																											
Quadrat size(m)	調査面積	225	150	150	100	150	100	40	100	15	15	50	100	100	100	225																											
Tree-1 layer(m)	高木層の高さ	13	16	18	-	15	8	-	10	-	-	-	-	13	-	15																											
Tree-1 layer(%)	高木層の植被率	70	70	70	-	60	70	-	80	-	-	-	-	70	-	60																											
Tree-2 layer(m)	亜高木層の高さ	8	10	10	8	8	-	5	7	-	-	5.5	7	8	7	8																											
Tree-2 layer(%)	亜高木層の植被率	10	20	20	70	30	-	80	5	-	-	70	70	20	70	10																											
Shrub layer(m)	低木層の高さ	4	2.5	4	2	3	2	2	3	3	2	2	3	4	4	2																											
Shrub layer(%)	低木層の植被率	20	10	10	30	40	20	40	20	90	90	30	60	30	40	5																											
Herb layer(m)	草本層の高さ	1	0.8	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.2	0.3	0.5	0.3	0.5	0.7	0.5																											
Herb layer(%)	草本層の植被率	90	90	30	20	40	20	20	40	10	20	20	30	20	80	90																											
Moss layer(%)	コケ層の植被率	-	5	20	50	5	70	20	30	10	60	70	40	50	10	5																											
Number of species	出現種数	11	10	26	22	22	17	24	27	30	23	22	20	33	30	8																											
Character species of association	群集標徴種																																										
Abies veitchii	シラビソ	T1	4・4	4・4	4・4	-	3・3	2・2	-	5・5	-	-	-	-	-	1・1																											
		T2	+	2・2	2・2	4・4	2・2	-	+	+	-	-	-	-	-	1・2																											
		S	+	+	1・1	2・3	1・2	+	+	1・2	+	-	-	-	-	1・2																											
		H	+	+	+	+	+	1・2	+	+	+	+	-	+	+	1・1																											
Abies mariesii	オオシラビソ	T1	2・2	-	-	-	3・3	4・4	+	+	-	-	-	-	-	-																											
		T2	-	-	-	-	1・1	-	4・4	-	-	-	-	-	-	-																											
		S	+	+	-	-	3・3	2・2	-	-	+	-	-	-	-	-																											
		H	+	+	-	-	-	2・2	-	+	-	-	-	-	-	-																											
Differential species of facies	ファシス区分種																																										
Sasa chartacea var. nana	ニッコウザサ	H	5・5	5・5	2・2	-	2・2	-	-	-	-	-	-	+	2	5・5																											
Character & differential species of association	群集標徴種・区分種																																										
Tsuga diversifolia	コメツガ	T1	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	4・4	-	-																											
		T2	-	-	-	-	-	2・2	-	-	-	1・2	4・4	2・3	-	-																											
		S	+	+	-	-	-	+	+	2・2	+	+	+	+	-	-																											
		H	+	+	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	-	-																											
Thuja standishii	クロベ	T2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4・4	+	-	-	-																											
		S	-	-	-	-	-	-	-	4・4	5・5	-	+	-	-	-																											
		H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-																											
Rhododendron degranianum	アズマシヤクナグ	S	-	-	-	+	-	-	-	+	-	2・2	4・4	2・3	-	-																											
		H	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	2・2	+	-	-																											
Ilex rugosa	ツルツグ	H	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	-	-																											
Linnaea borealis	リンネソウ	H	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	+	-	-	-																											
Ilex suerokii var. brevipedunculata	アカミノヌツグ	S	-	-	-	-	-	-	-	-	+	2・2	-	-	-	-																											
		H	-	-	-	-	-	-	-	-	2・2	-	-	-	-	-																											
Viburnum urceolatum f. procumbens	ミヤマシグレ	H	-	-	-	-	-	+	-	-	+	+	-	-	-	-																											
Pinus parviflora var. pentaphylla	キタゴヨウ	T1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+																											
		T2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-																											
		S,H	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	-																											
Differential species of community	群落区分種																																										
Larix kaempferi	カラマツ	T1	-	+	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	4・4																											
		T2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4・4	1・1																											
		S	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+																											
		H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+																											
Athyrium yokoscense	ヘビノネゴザ	H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																											
Differential species of community	群落区分種																																										
Betula ermanii	ダケカンバ	T1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4・4																											
		T2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+																											
		S,H	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-																											
Differential species of community	群落区分種																																										
Alnus viridis ssp. maximowiczii	ミヤマハンノキ	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																											
Deyeuxia sachalinensis	タカネナリヤス	H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5・5																											
Vaccinium uliginosum var. japonicum	クロマメノキ	H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2・2																											
Differential species to facies with Sasa chartacea var. nana ニッコウザサファシスに対する種																																											
Schizocodon soldanelloides var. soldanelloides	イワカミ	H	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	2・2																											
Vaccinium smallii var. smallii	オオバスノキ	S	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-																											
		H	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-																											
Streptopus streptopoides ssp. japonicus	タケシマラン	H	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-																											
Oxalis acetosella	コミヤマカタバミ	H	-	-	2・2	+	+	+	+	13	+	+	+	+	+	11																											
Cornus canadensis	ゴゼンタチバナ	H	-	-	+	1・2	+	+	+	+	+	+	+	+	+	10																											
Coptis trifolia	ミツバオウレン	H	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	9																											
Sorbus commixta	ナナカマド	T1	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	8																											
		T2	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-																											
		S	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	2・2																											
		H	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-																											
Thelypteris phegopteris	ミヤマウラビ	H	-	-	+	+	+	+	+	-	-	-	+	+	+	+																											
Species of Vaccinio-Piceetea	コケモートウレヒキラスの種																																										
Rhododendron brachycarpum	ハクサンシヤクナグ	S	-	+	+	-	+	+	3・3	1・1	+	1・2	-	-	2・2	-																											
		H	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	+	-	-																											
Pleurozium schreberi	タチハイゴク	M	-	-	2・2	1・2	+	-	1・2	+	-	2・2	4・4	+	-	-																											
Dicranum majus	チシマシツボグ	M	-	-	-	-	-	-	1・2	1・2	1・2	2・2	+	+	+	-																											
Hylocomium splendens	イワダレゴク	M	-	-	-	-	-	-	1・2	2・2	1・2	2・2	2・2	+	-	-																											
Vaccinium ovalifolium	クロウスゴ	S	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-																											
		H	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																											
		S	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-																											
Oplopanax japonicus	ハリブキ	H	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+																											
Pogonatum japonicum	セイヤカスギゴク	M	-	-	+	3・3	+	-	-	-	-	-	-	3・3	-	-																											
Clintonia udensis	ツバキオモト	H	-	-	+	-	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-																											
Lepidozia reptans	ハイスギバゴク	M	-	-	-	-	+	2・2	-	-	-	1・2	3・3	-	-	-																											
Hypnum tristoviride	イトハイゴク	M	-	-	+	+	-	-	-	1・1	-	-	-	2・3	-	-																											
Sphagnum girgensohnii	ホソバミスゴク	M	-	-	-	-	-	-	-	+	+	1・2	+	-	-	-																											

表2-2 森林群落 (2)

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<i>Rubus pedatus</i>	コガネイチゴ	H	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	2
<i>Pyrola alpina</i>	コバノイチヤクソウ	H	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	3
<i>Vaccinium vitis-idaea</i>	コケモモ	H	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	3
<i>Neottia nipponica</i>	ミヤマフタバラン	H	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	3
Companions	随伴種																			
<i>Maianthemum dilatatum</i>	マイヅルソウ	H	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	14
<i>Cerasus nipponica</i> var. <i>nipponica</i>	タカネザクラ (ミネザクラ)	T2	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	9
		S	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
		H	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
<i>Arachniodes mutica</i>	シノブカグマ	H	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	7
<i>Rhododendron pentandrum</i>	コヨウラクツツジ	S	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	6
<i>Vaccinium hirtum</i> var. <i>pubescens</i>	ウスノキ	S	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	5
		H	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
<i>Solidago virgaurea</i> ssp. <i>leiocarpa</i>	ミヤマアキノキリンソウ	H	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	5
<i>Viburnum furcatum</i>	オオカメノキ	S	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	4
		H	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
<i>Sorbus commixta</i> var. <i>rufoferruginea</i>	サビバナナカマド	T1	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	4
		T2	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
		S	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
		H	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
<i>Deyeuxia hakonensis</i>	ヒメノガリヤス	H	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	4
<i>Dryopteris expansa</i>	シラネウラボ	H	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	4
<i>Trientalis europaea</i>	ツマトリソウ	H	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	4
<i>Gaultheria miqueliana</i>	シラタマノキ	H	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	3
<i>Acer micranthum</i>	コミネカエデ	H	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	3
<i>Pinus parviflora</i> var. <i>parviflora</i>	ヒメコマツ	S	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	2
		H	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
<i>Fallopia japonica</i>	イタドリ	H	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	3
<i>Brachytheciaceae</i> sp.2	アオギスゴケ科の一種 2	M	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	2
<i>Dicranum japonicum</i>	シツボゴケ	M	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	2
<i>Brachytheciaceae</i> sp.1	アオギスゴケ科の一種 1	M	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	2
<i>Vaccinium smallii</i> var. <i>glabrum</i>	スノキ	H	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	2
<i>Polytrichum formosum</i>	オオスゴケ	M	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
<i>Tripterispermum japonicum</i> var. <i>involutum</i>	テンゴノコヅチ	H	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	2
<i>Bartramopsis lescunii</i>	フウリンゴケ	M	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	2
<i>Carex oxyandra</i>	ヒメスズ	H	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	2

出現1回の種 Species of one relevé only in column no.1: *Picea jezoensis* var. *hondoensis* トウヒ S+, H+, 3: *Saussurea mihoko-kawakamiana* トウミトウヒレン H+, *Trachycystis flagellaris* エゾチヨウチンゴケ M+, *Mnium lycopodioides* ナメリチヨウチンゴケ M+, 6: *Hypnum* sp. ハイゴケ属の一種 M-3・3, *Marchantiophyta* sp. 苔類の一種 M-1・2, 7: *Sasa kurilensis* シシマザサ H-1・1, *Rhizomnium nudum* ケナシチヨウチンゴケ M+, 8: *Lycopodium clavatum* var. *clavatum* エゾヒカゲノカズラ H-+・2, 9: *Deyeuxia longiseta* ヒゲノガリヤス H+, 10: カニコウモリ H+, 11: *Ptilium crista-castrensis* ダチヨウゴケ M-2・2, *Hypnum subimponens* ssp. *ulophyllum* ヤマハイゴケ M+, 12: *Platanthera mandarinorum* ssp. *ophrydioides* var. *monophylla* ヒトツバキノチドリ H+, *Diplophyllum plicatum* コオイゴケ M+, *Bazzania yoshinagana* ヨシナガムチゴケ M+, 13: *Mnium heterophyllum* コチヨウチンゴケ M-2・2, *Trillium apetalon* エンレイソウ H+, *Dryopteris crassirhizoma* オシダ H+, *Coptis japonica* var. *major* セリバオウレン H+, *Euonymus macropterus* ヒロハツリバナ S+, *Hymenophyllum polyanthos* ホソバコケシノブ H+, 14: *Sasa elegantissima* タンガザサ H-1・2, *Dactyloctenium aegyptium* イチヨウラン H+, *Deyeuxia purpurea* ssp. *langsdorffii* イワノガリヤス H+, *Rhododendron multiflora* ウラジロヨウラク H+, *Enkianthus campanulatus* サラサドウダン S+, *Malus toringo* ズミ S+, *Enkianthus campanulatus* var. *palibinii* ベニサラサドウダン H+, *Quercus crispula* var. *crispula* ミズナラ S+, 15: *Hypericum senanense* ssp. *mutiloides* イワオトギリ H+, 16: *Lycopodium clavatum* var. *robustum* エゾヒカゲノカズラ H+, *Monotropastrum humile* ギンリョウソウ H+, *Pinus koraiensis* チョウセンゴヨウ H+, *Rubus idaeus* ssp. *nipponicus* var. *hondoensis* ミヤマウラジロイチゴ H+, *Ostercium florentii* ミヤマニンジン H+, *Polytrichum formosum* オオスゴケ M+, *Pogonatum contortum* コセイタカスゴケ M+, 17: *Rubus idaeus* ssp. *melanolasius* ウラジロエゾイチゴ H-2・2, *Avenella flexuosa* コメススキ H-2・2.

調査地 Locality : column no. 1, 12: 水ノ塔山南尾根, 2, 12: 水ノ塔山南尾根, 3, 4, 13, 15, 16: 黒斑山登山道中コース, 5: 黒斑山山頂, 6: 蛇骨岳北西尾根, 7, 10: 東電ノ登山北西尾根, 8: 東・西電ノ登山鞍部, 9: 西電ノ登山山頂, 11: 水ノ塔山山頂北尾, 17: 蛇骨岳稜線北斜面.

表2-3 風衝地矮性低木群落

1. <i>Rubus subcrataegifolius</i> community				ミヤマニガイチゴ群落				5. <i>Veronica onoei</i> community				グンバイズル群落			
2. <i>Aconogonon weyrichii</i> var. <i>alpinum</i> community				オンタデ群落				6. <i>Chrysanthemum rupestre</i> community				イワインチン群落			
3. <i>Arenella flexuosa</i> community				コメスギ群落				7. <i>Fallopia japonica</i> community				イタドリ群落			
4. <i>Carex oxyandra</i> community				ヒメスギ群落				8. <i>Sasa nana</i> community				ニッコウササ群落			
Vegetation units				植生単位				1				2			
Column no.	通し番号			調査番号			調査年月日			調査年月日			調査年月日		
Stand number	調査番号			調査年月日			調査年月日			調査年月日			調査年月日		
Date of relevé	調査年月日			調査年月日			調査年月日			調査年月日			調査年月日		
Altitude(m)	2165 2030 2015 2290 2240 2165 2345 2305 2220 2222 2202 2160 1990 2150 2345 2085 2218 2220 2120 2115			2165 2030 2015 2290 2240 2165 2345 2305 2220 2222 2202 2160 1990 2150 2345 2085 2218 2220 2120 2115			2165 2030 2015 2290 2240 2165 2345 2305 2220 2222 2202 2160 1990 2150 2345 2085 2218 2220 2120 2115			2165 2030 2015 2290 2240 2165 2345 2305 2220 2222 2202 2160 1990 2150 2345 2085 2218 2220 2120 2115			2165 2030 2015 2290 2240 2165 2345 2305 2220 2222 2202 2160 1990 2150 2345 2085 2218 2220 2120 2115		
Slope direction	SW SW W SE NE SW S SE SE NW SW - - SW S NE SE NW NW SW			SW SW W SE NE SW S SE SE NW SW - - SW S NE SE NW NW SW			SW SW W SE NE SW S SE SE NW SW - - SW S NE SE NW NW SW			SW SW W SE NE SW S SE SE NW SW - - SW S NE SE NW NW SW			SW SW W SE NE SW S SE SE NW SW - - SW S NE SE NW NW SW		
Slope inclination(°)	40 15 - 40 70 40 - 40 20 10 70 - - 20 - 30 40 50 20 30 70			40 15 - 40 70 40 - 40 20 10 70 - - 20 - 30 40 50 20 30 70			40 15 - 40 70 40 - 40 20 10 70 - - 20 - 30 40 50 20 30 70			40 15 - 40 70 40 - 40 20 10 70 - - 20 - 30 40 50 20 30 70			40 15 - 40 70 40 - 40 20 10 70 - - 20 - 30 40 50 20 30 70		
Quadrat size (m)	5 30 10 5 30 5 30 10 80 5 10 - - 35 25 20 5 30 10 20 15			5 30 10 5 30 5 30 10 80 5 10 - - 35 25 20 5 30 10 20 15			5 30 10 5 30 5 30 10 80 5 10 - - 35 25 20 5 30 10 20 15			5 30 10 5 30 5 30 10 80 5 10 - - 35 25 20 5 30 10 20 15			5 30 10 5 30 5 30 10 80 5 10 - - 35 25 20 5 30 10 20 15		
Herb layer(m)	0.25 1 1 0.6 0.6 0.25 1 1 0.12 0.24 0.18 0.06 0.06 1 0.2 2 1 4 2 4			0.25 1 1 0.6 0.6 0.25 1 1 0.12 0.24 0.18 0.06 0.06 1 0.2 2 1 4 2 4			0.25 1 1 0.6 0.6 0.25 1 1 0.12 0.24 0.18 0.06 0.06 1 0.2 2 1 4 2 4			0.25 1 1 0.6 0.6 0.25 1 1 0.12 0.24 0.18 0.06 0.06 1 0.2 2 1 4 2 4			0.25 1 1 0.6 0.6 0.25 1 1 0.12 0.24 0.18 0.06 0.06 1 0.2 2 1 4 2 4		
Herb layer(%)	0.1 0.2 0.25 0.25 0.25 0.3 0.3 0.3 0.15 0.25 0.2 0.15 0.06 0.2 0.5 0.7 0.9 0.5 0.5			0.1 0.2 0.25 0.25 0.25 0.3 0.3 0.3 0.15 0.25 0.2 0.15 0.06 0.2 0.5 0.7 0.9 0.5 0.5			0.1 0.2 0.25 0.25 0.25 0.3 0.3 0.3 0.15 0.25 0.2 0.15 0.06 0.2 0.5 0.7 0.9 0.5 0.5			0.1 0.2 0.25 0.25 0.25 0.3 0.3 0.3 0.15 0.25 0.2 0.15 0.06 0.2 0.5 0.7 0.9 0.5 0.5			0.1 0.2 0.25 0.25 0.25 0.3 0.3 0.3 0.15 0.25 0.2 0.15 0.06 0.2 0.5 0.7 0.9 0.5 0.5		
Moss layer(%)	40 50 30 40 60 30 30 60 80 80 60 90 40 40 60 95 60 100 100 90			40 50 30 40 60 30 30 60 80 80 60 90 40 40 60 95 60 100 100 90			40 50 30 40 60 30 30 60 80 80 60 90 40 40 60 95 60 100 100 90			40 50 30 40 60 30 30 60 80 80 60 90 40 40 60 95 60 100 100 90			40 50 30 40 60 30 30 60 80 80 60 90 40 40 60 95 60 100 100 90		
Number of species	1 1 1 1 1 2 5 3 2 3 5 7 2 6 5 4 4 5 10 3 7 4			1 1 1 1 1 2 5 3 2 3 5 7 2 6 5 4 4 5 10 3 7 4			1 1 1 1 1 2 5 3 2 3 5 7 2 6 5 4 4 5 10 3 7 4			1 1 1 1 1 2 5 3 2 3 5 7 2 6 5 4 4 5 10 3 7 4			1 1 1 1 1 2 5 3 2 3 5 7 2 6 5 4 4 5 10 3 7 4		
Differential species of community	ミヤマニガイチゴ			ミヤマニガイチゴ			ミヤマニガイチゴ			ミヤマニガイチゴ			ミヤマニガイチゴ		
<i>Rubus subcrataegifolius</i>	3-3			3-3			3-3			3-3			3-3		
Differential species of community	オンタデ			オンタデ			オンタデ			オンタデ			オンタデ		
<i>Aconogonon weyrichii</i> var. <i>alpinum</i>	3-3 3-3 3-3 4-4 2-2 2-2 4-3			3-3 3-3 3-3 4-4 2-2 2-2 4-3			3-3 3-3 3-3 4-4 2-2 2-2 4-3			3-3 3-3 3-3 4-4 2-2 2-2 4-3			3-3 3-3 3-3 4-4 2-2 2-2 4-3		
Differential species of community	コメスギ			コメスギ			コメスギ			コメスギ			コメスギ		
<i>Arenella flexuosa</i>	ウシノケグサ			ウシノケグサ			ウシノケグサ			ウシノケグサ			ウシノケグサ		
<i>Festuca ovina</i>	ヒメスギ			ヒメスギ			ヒメスギ			ヒメスギ			ヒメスギ		
Differential species of community	グンバイズル			グンバイズル			グンバイズル			グンバイズル			グンバイズル		
<i>Carex oxyandra</i>	コバノスナゴケ			コバノスナゴケ			コバノスナゴケ			コバノスナゴケ			コバノスナゴケ		
Differential species of community	イワインチン			イワインチン			イワインチン			イワインチン			イワインチン		
<i>Veronica onoei</i>	イブキジャコウソウ			イブキジャコウソウ			イブキジャコウソウ			イブキジャコウソウ			イブキジャコウソウ		
<i>Minium heterophyllum</i>	イタドリ			イタドリ			イタドリ			イタドリ			イタドリ		
Differential species of community	ミヤマアキノキリンソウ			ミヤマアキノキリンソウ			ミヤマアキノキリンソウ			ミヤマアキノキリンソウ			ミヤマアキノキリンソウ		
<i>Chrysanthemum rupestre</i>	ハクサンオミナエシ			ハクサンオミナエシ			ハクサンオミナエシ			ハクサンオミナエシ			ハクサンオミナエシ		
<i>Thymus quinquecostatus</i> var. <i>ibukiensis</i>	ニッコウササ			ニッコウササ			ニッコウササ			ニッコウササ			ニッコウササ		
Differential species of community	ヒゲノガリヤス			ヒゲノガリヤス			ヒゲノガリヤス			ヒゲノガリヤス			ヒゲノガリヤス		
<i>Fallopia japonica</i>	ヒゲノガリヤス			ヒゲノガリヤス			ヒゲノガリヤス			ヒゲノガリヤス			ヒゲノガリヤス		
<i>Solidago virgaurea</i> ssp. <i>leiocarpa</i>	ヒゲノガリヤス			ヒゲノガリヤス			ヒゲノガリヤス			ヒゲノガリヤス			ヒゲノガリヤス		
<i>Patrinia triloba</i> var. <i>triloba</i>	ヒゲノガリヤス			ヒゲノガリヤス			ヒゲノガリヤス			ヒゲノガリヤス			ヒゲノガリヤス		
Differential species of community	ヒゲノガリヤス			ヒゲノガリヤス			ヒゲノガリヤス			ヒゲノガリヤス			ヒゲノガリヤス		
<i>Sasa nana</i>	ヒゲノガリヤス			ヒゲノガリヤス			ヒゲノガリヤス			ヒゲノガリヤス			ヒゲノガリヤス		
<i>Sasa nipponica</i>	ヒゲノガリヤス			ヒゲノガリヤス			ヒゲノガリヤス			ヒゲノガリヤス			ヒゲノガリヤス		
<i>Deyeuxia longiseta</i>	ヒゲノガリヤス			ヒゲノガリヤス			ヒゲノガリヤス			ヒゲノガリヤス			ヒゲノガリヤス		
Companions	ヒゲノガリヤス			ヒゲノガリヤス			ヒゲノガリヤス			ヒゲノガリヤス			ヒゲノガリヤス		
<i>Deyeuxia purpurea</i> ssp. <i>langsdorffii</i>	ヒゲノガリヤス			ヒゲノガリヤス			ヒゲノガリヤス			ヒゲノガリヤス			ヒゲノガリヤス		
<i>Ostericum florentii</i>	ヒゲノガリヤス			ヒゲノガリヤス			ヒゲノガリヤス			ヒゲノガリヤス			ヒゲノガリヤス		
<i>Agrostis clavata</i> ssp. <i>clavata</i>	ヒゲノガリヤス			ヒゲノガリヤス			ヒゲノガリヤス			ヒゲノガリヤス			ヒゲノガリヤス		
<i>Ixendium alpicola</i>	ヒゲノガリヤス			ヒゲノガリヤス			ヒゲノガリヤス			ヒゲノガリヤス			ヒゲノガリヤス		
<i>Vaccinium vitis-Idaea</i>	ヒゲノガリヤス			ヒゲノガリヤス			ヒゲノガリヤス			ヒゲノガリヤス			ヒゲノガリヤス		
<i>Hypericum senanense</i> ssp. <i>multiloides</i>	ヒゲノガリヤス			ヒゲノガリヤス			ヒゲノガリヤス			ヒゲノガリヤス			ヒゲノガリヤス		
<i>Hypericum vitis-Idaea</i>	ヒゲノガリヤス			ヒゲノガリヤス			ヒゲノガリヤス			ヒゲノガリヤス			ヒゲノガリヤス		
出現一回の種	Species of one releve only in column no.6: <i>Betula ermanii</i> ダケカンパ H+, 7: <i>Aruncus dioicus</i> var. <i>kantschaticus</i> ヤマブキシヨウマ H+, 9: <i>Empetrum nigrum</i> var. <i>japonicum</i> ガンコウラン H-1-2, <i>Vaccinium uliginosum</i> var. <i>japonicum</i> クロマメノキ H+, 11: <i>Aletis foliata</i> ネバリノギリ H+, 13: <i>Tsuga diversifolia</i> コメツガ T1+, 14: <i>Gaultheria miqueliana</i> シラタメノキ H+, 16: <i>Deyeuxia sachalinensis</i> タカネノガリヤス H-4, 17: <i>Deyeuxia hakonensis</i> ヒメノガリヤス H+, 18: <i>Leontopodium japonicum</i> ウスユキノソウ H-1-2, <i>Saussurea mihoko-kawakamiana</i> トウモロコシ H+, 20: <i>Rubus idaeus</i> ssp. <i>nipponicus</i> var. <i>hondoensis</i> ミヤマウラジロイサゴ H-2-2, <i>Thelypteris phegopteris</i> ミヤマワラビ H+, <i>Gentiana makinoi</i> オヤマリンドウ H+.			Species of one releve only in column no.6: <i>Betula ermanii</i> ダケカンパ H+, 7: <i>Aruncus dioicus</i> var. <i>kantschaticus</i> ヤマブキシヨウマ H+, 9: <i>Empetrum nigrum</i> var. <i>japonicum</i> ガンコウラン H-1-2, <i>Vaccinium uliginosum</i> var. <i>japonicum</i> クロマメノキ H+, 11: <i>Aletis foliata</i> ネバリノギリ H+, 13: <i>Tsuga diversifolia</i> コメツガ T1+, 14: <i>Gaultheria miqueliana</i> シラタメノキ H+, 16: <i>Deyeuxia sachalinensis</i> タカネノガリヤス H-4, 17: <i>Deyeuxia hakonensis</i> ヒメノガリヤス H+, 18: <i>Leontopodium japonicum</i> ウスユキノソウ H-1-2, <i>Saussurea mihoko-kawakamiana</i> トウモロコシ H+, 20: <i>Rubus idaeus</i> ssp. <i>nipponicus</i> var. <i>hondoensis</i> ミヤマウラジロイサゴ H-2-2, <i>Thelypteris phegopteris</i> ミヤマワラビ H+, <i>Gentiana makinoi</i> オヤマリンドウ H+.			Species of one releve only in column no.6: <i>Betula ermanii</i> ダケカン								

調査地 Locality : column no. 1, 6, 15: 水ノ塔山西尾根, 2, 7, 14: 黒駒山登山道コース, 3, 17: 水ノ塔山南尾根, 4: 仙人岳東, 5, 8, 16: 鋸岳稜線, 9: 仙人岳西稜線, 10, 11, 18-, 20: 東麓ノ登山頂, 12: 水ノ塔山頂, 13: 西麓ノ登山南東尾根, 21: 東麓ノ登山山頂北西.

表2-4 砂礫地植物群落ほか

		1. Rhododendretum tschonoskii tetramerifolium 2. Arctio-Vaccinium uliginosifolium a1-a2, typicum 典型亜群集 (a1: facies with Calamagrostis sachalinensis タカネノガリヤスファシアス) b. ostericumetosum ミヤマニンジン亜群集										3. Phylodoce nipponica community ウランマツツヅククロマメノキ群集 Empetrum nigrum var. japonicum community Arctico-Loiseleurietum procumbentis										ツガザクラ群落 ガンコウラン群落 コメバツガザクラ-ミネズオウ群集																																			
Vegetation units		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28	
Column no. Stand number		a1		a2		b		c		d		e		f		g		h		i		j		k		l		m		n		o		p		q		r		s		t		u		v		w		x		y		z			
Date of relevé		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28	
Altitude(m)		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28	
Slope direction		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28	
Slope inclination(°)		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28	
Quadrat size(m)		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28	
Herb layer(m)		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28	
Moss layer(%)		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28	
Number of species		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28	
Character species of association		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28	
Rhododendron tetramerifolium		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28	
Character & differential species of association		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28	
Vaccinium uliginosum var. japonicum		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28	
Maianthemum dilatatum		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28	
Differential species of facies		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28	
Differential species of subassociation		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28	
Soldago virgaurea ssp. leucarpa		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28	
Ostericum florentii		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28	
Differential species of community		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28	
Phylodoce nipponica		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28	
Character species of association		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28	
Arcteria nana		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28	
Cassiope lycpodioloides		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28	
Loiseleuria procumbens		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28	
Differential species of community		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28	
Empetrum nigrum var. japonicum		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28	
Companions		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28	
Vaccinium vitis-idaea		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28	
Carex oxycorda		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28	
Schizocodon soldanelloides var. soldanelloides		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28	
Arenella flexuosa		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28	
Ixeridium alpicola		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28	
Racomitrium laetum		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28	
Patrinia triloba var. triloba		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28	
Racomitrium barbuloides		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28	
Racomitrium lanuginosum		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28	
Aleris foliata		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28	
Elliptia bracteata		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28	
Pinus parviflora var. parviflora		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28	
Carex doeritzi		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28	
Carex lasiocarpa		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28	
Carex lasiocarpa		1		2																																																					

(3) 植物相

籠ノ登山(東西)、水ノ塔山及び浅間外輪山の維管束植物目録

- 1 調査者：大平 満 Ohdaira, Mitsuru、吉井広始 Yoshii, Hiroshi、片野光一 Katano, Koichi、鈴木伸一 Suzuki, Shin-ichi
- 2 調査方法及び調査日と踏査経路
調査は、主に登山道沿いを中心に歩きながら目視と標本採集、写真撮影により行った。
 - 2021年6月29日：高峰温泉1943m～水ノ塔山2202m～東籠ノ登山2228m～西籠ノ登山2212m(往復)〔吉井〕
 - 2021年6月30日：車坂峠登山口1973m～(中コース)～トーミの頭2300m～黒斑山2404m～(表コース)～槍ヶ鞘～車坂峠登山口〔大平、吉井〕
 - 2021年7月 7日：池の平駐車場2056m～東籠ノ登山～西籠ノ登山(往復)〔大平〕
 - 2021年8月 5日：池の平駐車場～東籠ノ登山～西籠ノ登山(往復)〔大平〕
 - 2021年8月24日：高峰温泉～水ノ塔山～東籠ノ登山～池の平〔大平・吉井・片野〕
 - 2021年8月25日：車坂峠～粒ヶ平～高峯山2106m～高峰温泉口～高峰林道～高峰高原ビジターセンター(VC駐車場1967m)～(中コース)～トーミの頭～黒斑山～トーミの頭～(中コース)～VC駐車場〔吉井〕
 - 2022年7月27日：池の平駐車場～東籠ノ登山～西籠ノ登山(往復)〔吉井・大平・鈴木〕
 - 2022年7月28日：VC駐車場(裏コース)～蛇骨岳2366m～仙人岳2319.7m～Jバンド～鋸岳2254m(往復)〔吉井・大平・片野〕
 - 2022年8月16日：車坂峠～粒ヶ平～高峯山(往復)〔大平〕
 - 2022年9月10日：VC駐車場～(中コース)～トーミの頭～黒斑山～蛇骨岳～仙人岳～Jバンド～鋸岳(往復)〔吉井〕

採集地点を図2-10に示した。

- 3 本調査で採集記録された種と群馬県立自然史博物館ハーバリウム(GMNHJ)に収蔵の下記標本を合わせて目録とした。

標本を伴わない記録は掲載しなかった。結果、57科151属241種6亜種10変種0品種1雑種(258種内分類群)として整理された。1科1属1種については保護上、その他の理由で本目録には掲載していない。備考欄の3桁、4桁の標本no.は大平、KgA-Hは吉井によって採集されたものである。なお、大平の標本については最終的に大森威宏(県立自然史博物館)が同定を行った。

【採集者(略号)：Name 採集年_標本点数(総計178点)】

須藤志成幸(Su)：Suto, S. 1961～'63_27点, '71～'74_24点, '77・'78_9点, '84_5点, '87_3点, 採集年不明_1点 計69点

滝沢敦男(Ta)：Takizawa, A. 1966_4点, '71_5点, '75_5点, '77_3点, '78_1点 計18点

増田公平(Ms)：Masuda, K. 1971_1点

戸部正久(To)：Tobe, M. 1967_1点

松沢篤郎(Mt)：Matsuzawa, T. 1991_1点, 2004_1点 計2点

大森威宏・増田和明(OM)：Ohmori, T.・Masuda, K. 2003_24点, '04_18点 計42点

大森威宏(O)：Ohmori, T. 2004_42点

里見哲夫(Sa)：Satomi, T. 2016_3点



図2-10 維管束植物採集地点(電子国土Web地理院地図に加筆)

- 4 科の配列及び学名は、日本維管束植物目録（米倉2012）に従ったが、シダ植物の科の分類については Fern GreenList ver. 1.01によった。学名の配列はアルファベット順とした。
- 5 採集地①～③は、標本を採集した場所と期日の概要は下記のとおりである。なお、②の*印は県境をわずかに外れた長野県 小諸市側の採集品を示す。
- ① 高峰温泉～水ノ塔山～東・西麓ノ登山 2021:6/29, 7/7, 8/5, 8/24, 2022:7/27
- ② 高峰高原（スキー場・高峯山） 2021:6/24, 8/24・25, 2022:8/16
- ③ 車坂峠～(中コース)～黒斑山、～(裏コース)～蛇骨岳～鋸山 2021:6/30, 8/25, 2022:7/28, 9/1
- 6 備考欄の固は（日本固有種）、外は（国外外来種）であり、記録された241種における固有率は37.8%、帰化率は4.6%である。
- また、環境省レッドリスト2020 (<https://www.env.go.jp/press/107905.html>、（参照 2023-1-10））掲載種、及び群馬県の植物レッドリスト（2022年改訂版 (<https://www.pref.gunma.jp/page/7058.html>、（参照 2023-1-10）））掲載種については、そのランクを記した（群馬県は括弧書き）。

学名	和名	採集地			備考 固有種, 外来種, RDB種: 県(国), 標本No他
		①	②	③	
Lycopodiaceae ヒカゲノカズラ科					
<i>Huperzia serrata</i> var. <i>serrata</i> f. <i>serrata</i>	トウゲシバ(ホソバトウゲシバ)	○			(OM) 4239
<i>Lycopodium annotinum</i> var. <i>annotinum</i>	スギカズラ	○			982 1900 KgA-H013(O) 4146
<i>L. clavatum</i>	ヒカゲノカズラ	○	○		1116 1166 (Sa)
<i>L. clavatum</i> var. <i>asiaticum</i>	エゾヒカゲノカズラ	○	○		881
<i>L. complanatum</i>	アスヒカズラ	○			1911 KgA-H188(OM) 4390
<i>L. dendroideum</i>	マンネンシギ	○			840 1105 1912 KgA-H005, -H189, -H200 (Su) 6074
<i>L. sitchense</i> var. <i>nikoense</i>	タカネヒカゲノカズラ			○	KgA-H062, -H201, -H202
Ophioglossaceae ハナヤスリ科					
<i>Botrychium multifidum</i> var. <i>robustum</i>	エゾフユノハナワラビ			○	1174
Osmundaceae ゼンマイ科					
<i>Osmundastrum cinnamomeum</i> var. <i>fokiense</i>	ヤマドリゼンマイ	○			1906 KgA-H184
Hymenophyllaceae コケシノブ科					
<i>Hymenophyllum polyanthos</i>	ホソバコケシノブ			○	KgA-H049
<i>H. wrightii</i>	コケシノブ	○			874(O) 4147
Thelypteridaceae ヒメシダ科					
<i>Thelypteris laxa</i>	ヤワラシダ			○	(Su) 6179
<i>T. phegopteris</i>	ミヤマワラビ	○	○		799 842 861 953 (O) 4133, 4152
Woodsiaceae イワデンダ科					
<i>Cystopteris filix-fragilis</i>	ナヨシダ			○	(Su) 6177
Athyriaceae メンダ科					
<i>Athyrium rupestre</i>	ミヤマヘビノネゴザ	○			(Su) 8376
<i>A. vidalii</i>	ヤマイヌワラビ			○	(Su) 5982
<i>A. yokoscense</i>	ヘビノネゴザ	○	*		830 859 879 1098 KgA-H057(O) 4153 (Su) 8376
<i>Arachniodes mutica</i>	シノブカグマ	○			857 887 974 (O) 4158
Blechnaceae シシガシラ科					
<i>Blechnum amabile</i>	オサシダ			○	固 (Ms) 1341
Dryopteridaceae オンシダ科					
<i>Dryopteris amurensis</i>	オクヤマシダ			○	KgA-H199
<i>D. crassirhizoma</i>	オンシダ	○	*		828 880
<i>D. expansa</i>	シラネワラビ	○	○		841 (T) 1993
<i>D. maximowiczii</i>	ナンタイシダ	○			(Su) 8347
Pinaceae マツ科					
<i>Abies mariesii</i>	オオシラビソ	○			固 933 (O) 4140, 4143
<i>A. veitchii</i> var. <i>veitchii</i>	シラビソ	○			固 868 890 934 963 KgA-H009, -H027 (O) 4142
<i>Larix kaempferi</i>	カラマツ	○	○		固 816 957 KgA-H116(OM) 3298, 4390
<i>Picea jezoensis</i> var. <i>hondoensis</i>	トウヒ	○			固 1913 P-2 KgA-H017, -H040
<i>Pinus densiflora</i>	アカマツ	○			894
<i>P. koraiensis</i>	チョウセンゴヨウ			○	907
<i>P. parviflora</i> var. <i>parviflora</i>	ヒメコマツ(ゴヨウマツ)	○	○		KgA-H074 (O) 3297
<i>P. parviflora</i> var. <i>pentaphylla</i>	キタゴヨウ	○	○		固 822 848 949 979 1915 KgA-H002, -H060 (Su)
<i>Tsuga diversifolia</i>	コメツガ	○	○		固 821 863 967 KgA-H008, -H026 (O) 4141 (OM) 4392
Cupressaceae ヒノキ科					
<i>Thuja standishii</i>	ネズコ(クロベ)	○			固 972 1132 KgA-H025 (Su) (OM) 4238
Nartheciaceae キンコウカ科					
<i>Aletis foliata</i>	ネバリノギラン	○	○		固 899 1072 2035
Melanthiaceae シュロソウ科					
<i>Veratrum maackii</i> var. <i>maackioides</i>	ホソバシュロソウ	○	*		1078 KgA-H157
<i>V. oxysepalum</i> var. <i>oxysepalum</i>	バイケイソウ			○	909 1149
Liliaceae ユリ科					
<i>Clintonia udensis</i>	ツバメオモト	○	*		865 1086 (O) 4165
<i>Lilium medeoloides</i> var. <i>medeoloides</i>	クルマユリ	○			1141
<i>Streptopus streptopoides</i> subsp. <i>japonicus</i>	タケシマラン	○			固 869 1112 1147 KgA-H066 (O) 4160
Orchidaceae ラン科					
<i>Dactyloctenium ringens</i>	イチヨウラン	○			固 (EN) 978 KgA-H014
<i>Ephippianthus schmidtii</i>	コイチヨウラン	○			(Su) (O) 4138
<i>Epipactis papillosa</i> var. <i>papillosa</i>	エゾスズラン	○	*		1113 1910
<i>Goodyera repens</i>	ヒメミヤマウズラ	○			CR 1902
<i>Liparis krameri</i> var. <i>krameri</i>	ジガバチソウ			○	(Ta)
<i>Neottia cordata</i>	コフタバラン			○	930

学名	和名	採集地			備考 固有種, 外来種, RDB種: 県(国), 標本No他
		①	②	③	
<i>N. nipponica</i>	ミヤマフタバラン	○		○	976 1081 1133 KgA-H015, -H034, -H195 (Su) (O)4139 (Su)
<i>Platanthera mandarinorum</i> subsp. <i>mandarinorum</i> var. <i>oreades</i>	ヤマサギソウ			○	
<i>P. ophrydioides</i> var. <i>monophylla</i> f. <i>monophylla</i>	ヒトツバキノソチドリ	○			固 1134 KgA-H012 (Su) (O)4166 (OM)3293
<i>P. tipuloides</i> subsp. <i>nipponica</i>	コバノ トンボソウ		○		
<i>P. tipuloides</i> subsp. <i>tipuloides</i> var. <i>sororia</i>	ホソバノキノソチドリ	○		○	1063 1908 (Su) (Ta)
Xanthorrhoeaceae ススキノキ科					
<i>Hemerocallis dumortieri</i> var. <i>esculenta</i>	ゼンテイカ (ニッコウキスゲ)		○		(OM)3290
Asparagaceae キジカクシ科					
<i>Convallaria majalis</i> var. <i>manshurica</i>	スズラン			○	KgA-H047 (OM)4399
<i>Maianthemum dilatatum</i>	マイヅルソウ	○	○	○	797 818 981 2029 KgA-H043
<i>Polygonatum humile</i>	ヒメイズイ			○	KgA-H048
Juncaceae イグサ科					
<i>Juncus tenuis</i>	クサイ	○	*		外 1109 KgA-H153
<i>Luzula multiflora</i>	ヤマスズメノヒエ	○		○	833 1126 (Su) (OM)3289, 3295
<i>L. oligantha</i>	タカネスズメノヒエ		○		2045
Cyperaceae カヤツリグサ科					
<i>Carex doenitzii</i>	コタヌキラン	○		○	固 919 925 KgA-H045
<i>C. leucochlora</i> var. <i>morrisonicola</i>	ニイタカスゲ	○			846 (OM)3576
<i>C. oxyandra</i> var. <i>oxyandra</i>	ヒメスゲ	○		○	831 903 943 KgA-H058
<i>C. sachalinensis</i> var. <i>iwakiana</i>	コイトスゲ (ゴンゲンスゲ)	○		○	固 KgA-H186, -H194
<i>C. sachalinensis</i> var. <i>longiuscula</i>	ミヤマアオスゲ			○	固 (Su) (Ta)1168
Poaceae イネ科					
<i>Agrostis canina</i>	ヒメヌカボ		○		外 KgA-H126
<i>A. flaccida</i>	ミヤマヌカボ	○	○	○	1067 1139 1896 KgA-H073, -H173, -H183 (OM)3586 (O)4129
<i>A. gigantea</i>	コヌカグサ		○		外 KgA-H127 (OM)3588, 3591
<i>Anthoxanthum horsfieldii</i> var. <i>japonicum</i>	タカネコウボウ	○	○		固 (O)4151 (OM)3287
<i>Arundinella hirta</i> var. <i>ciliata</i>	ウスゲトダシバ		○		KgA-H122
<i>Avenella flexuosa</i>	コメススキ	○		○	836 901 960 KgA-H007 (O)4127 (Ta)1123
<i>Calamagrostis hakonensis</i>	ヒメノガリヤス	○	*	○	1130 1144 1921 KgA-H198
<i>C. longiseta</i>	ヒゲノガリヤス	○		○	固 1128 1143 KgA-H098, -H099 (O)4136
<i>C. nana</i> subsp. <i>nana</i>	ヒナガリヤス	○			KgA-H072
<i>C. purpurea</i> subsp. <i>langsдорffii</i>	イワノガリヤス	○	○	○	883 1074 1122 1173 KgA-H104 (Su) (O)4150 (Ta)2006
<i>C. sachalinensis</i>	タカネノガリヤス	○		○	KgA-H176, -H206 (O)4128
<i>Dactylis glomerata</i>	カモガヤ		○		外 KgA-H135
<i>Festuca ovina</i> subsp. <i>ovina</i> var. <i>ovina</i>	シンウシノケグサ (ウシノケグサ)	○	*	○	837 902 1075 1138 KgA-H046 (Su) (O)4130
<i>Phleum pratense</i>	オオアワガエリ		○		外 KgA-H119
<i>Sasa chartacea</i> var. <i>nana</i>	ニッコウザサ	○	○	○	固 KgA-H055, -H065, -H076, -H080, -H100, -H118, -H172, -H196 (Ta)1300
<i>S. elegantissima</i>	タンガザサ	○			固 1123 KgA-H075, -H083
<i>S. nipponica</i>	ミヤコザサ	○			固 KgA-H092, -H097
<i>S. samaniensis</i> var. <i>yoshinoi</i>	ビッチュウミヤコザサ	○			固 1111 KgA-H091
<i>S. senanensis</i> var. <i>senanensis</i>	クマイザサ	○		○	884 958 (Mu)
<i>S. septentrionalis</i> var. <i>septentrionalis</i>	ミヤマザサ		○		
Ranunculaceae キンボウゲ科					
<i>Aconitum japonicum</i> subsp. <i>japonicum</i>	ヤマトリカブト (ハコネトリカブト)			○	固 KgA-H180
<i>A. japonicum</i> subsp. <i>maritimum</i> var. <i>maritimum</i>	ツクバトリカブト	○			固 (To)
<i>Anemone debilis</i>	ヒメイチゲ			○	860 (O)4164
<i>A. narcissiflora</i> subsp. <i>nipponica</i>	ハクサンイチゲ		*	○	固 915
<i>Coptis japonica</i> var. <i>japonica</i>	コセリバオウレン	○			固 872 878 KgA-H185 (O)4155
<i>C. japonica</i> var. <i>major</i>	セリバオウレン			○	固 (Ta)1324
<i>C. trifolia</i>	ミツバオウレン	○	*	○	800 864 927 983 (O)4389
<i>Thalictrum aquilegifolium</i> var. <i>intermedium</i>	カラマツソウ	○	○		固 1151 2039
Saxifragaceae ユキノシタ科					
<i>Astilbe formosa</i>	ハナチダケサシ	○			固 (Su)
<i>A. odontophylla</i> var. <i>odontophylla</i>	トリアシショウマ		○		固 KgA-H163
<i>Tiarella polyphylla</i>	ズダヤクシュ		○		2043 2044 KgA-H166, -H167
Fabaceae マメ科					
<i>Hedysarum vicioides</i> subsp. <i>japonicum</i> var. <i>japonicum</i>	イワオウギ			○	(Su)
<i>Trifolium lupinaster</i>	シャジクソウ	○	○	○	1089 1106 2026 KgA-H136 (OM)3286
<i>T. pratense</i>	ムラサキツメクサ		○		外 KgA-H134
<i>T. repens</i>	シロツメクサ		○		外 KgA-H133
Rosaceae バラ科					
<i>Agrimonia pilosa</i> var. <i>japonica</i>	キンミズヒキ		○		KgA-H108
<i>Aruncus dioicus</i> var. <i>kamtschaticus</i>	ヤマブキシウマ	○	○	○	997 1898 2027
<i>Cerasus nipponica</i> var. <i>nipponica</i>	タカネザクラ	○	*	○	固 798 815 992 KgA-H028, -H146
<i>Filipendula multijuga</i> var. <i>ciliata</i>	アカバナシモツケソウ		○		固 2019
<i>Fragaria nipponica</i>	シロバナノヘビイチゴ		*	○	908 KgA-H143 (Su)
<i>Malus toringo</i> var. <i>toringo</i>	ズミ	○	*		固 812 1107
<i>Potentilla freyniana</i>	ミツバツチグリ			○	807
<i>P. stolonifera</i>	ツルキジムシロ			○	KgA-H063
<i>Rubus crataegifolius</i>	クマイチゴ		○		2041
<i>R. idaeus</i> subsp. <i>nipponicus</i> var. <i>hondoensis</i>	ミヤマウラジロイチゴ	○		○	固 891 951 1064 KgA-H035, -H053
<i>R. pedatus</i>	コガネイチゴ			○	911 (Su)
<i>R. subcrataegifolius</i>	ミヤマニガイチゴ	○	*		850 900 961
<i>Sanguisorba officinalis</i>	ワレモコウ		○	○	2060 (OM)3590
<i>Sorbus commixta</i> var. <i>commixta</i>	ナナカマド	○	*	○	803 959 1148 KgA-H141, -H142
<i>S. commixta</i> var. <i>rufoferruginea</i>	サビバナナカマド	○	○		固 823 1108
<i>Spiraea japonica</i> var. <i>japonica</i>	シモツケ	○		○	1095 KgA-H085
Elaeagnaceae グミ科					
<i>Elaeagnus multiflora</i> var. <i>multiflora</i>	ナツグミ			○	固 1909 KgA-H187

学 名	和 名	採集地			備 考 固有種, 外来種, RDB種: 県(国), 標本No.他
		①	②	③	
Fagaceae ブナ科					
<i>Quercus crispula</i> var. <i>crispula</i>	ミズナラ		○	○	877
Betulaceae カバノキ科					
<i>Alnus viridis</i> subsp. <i>maximowiczii</i> var. <i>maximowiczii</i>	ミヤマハンノキ		*	○	916 920 KgA-H061, -H115, -H145
<i>Betula ermanii</i> var. <i>ermanii</i>	ダケカンバ	○	○	○	814 832 950 KgA-H081 (OM) 4396
<i>B. schmidtii</i>	オノオレカンバ			○	(Su)
<i>Corylus sieboldiana</i> var. <i>sieboldiana</i>	ツノハシバミ	○	*		KgA-H158
Celastraceae ニシキギ科					
<i>Euonymus macropterus</i>	ヒロハノツリバナ			○	873 1150
<i>Parnassia palustris</i> var. <i>palustris</i>	ウメバチソウ		○	○	2057 KgA-H177 (OM) 3587
Oxalidaceae カタバミ科					
<i>Oxalis acetosella</i> var. <i>acetosella</i>	コミヤマカタバミ	○		○	862 914 (O) 4159
Salicaceae ヤナギ科					
<i>Salix caprea</i>	バッコヤナギ	○			固 1110
<i>S. integra</i>	イヌコリヤナギ		○		2059
<i>S. reinii</i>	ミヤマヤナギ	○	○	○	811 817 954 KgA-H018, -H117
<i>S. udensis</i>	オノエヤナギ	○			1115
Violaceae スミレ科					
<i>Viola biflora</i> var. <i>biflora</i>	キバナノコマノツメ	○		○	910 921 KgA-H038
<i>V. blandiformis</i>	ウスバスミレ	○			(O) 4156
<i>V. yazawana</i>	ヒメスミレサイシン		○		2028
Hypericaceae オトギリソウ科					
<i>Hypericum senanense</i> subsp. <i>mutioides</i>	イワオトギリ	○	○	○	固 940 1077 (Su) (OM) 3288 (T) 2063
Geraniaceae フウロソウ科					
<i>Geranium onoei</i> var. <i>onoei</i>	グンナイフウロ			○	(Su)
<i>G. yesoense</i> var. <i>nipponicum</i>	ハクサンフウロ	○	○	固	KgA-H137
<i>G. yesoense</i> var. <i>yesoense</i>	エゾフウロ	○	○	固	2020 (Su) (OM) 3284
Onagraceae アカバナ科					
<i>Chamerion angustifolium</i> subsp. <i>angustifolium</i>	ヤナギラン		○	○	KgA-H103
<i>C. angustifolium</i> subsp. <i>circumvagum</i>	ウスゲヤナギラン		○		2052
<i>Epilobium amurense</i> subsp. <i>amurense</i>	ケゴンアカバナ			○	1164 1169
<i>E. amurense</i> subsp. <i>cephalostigma</i>	イワアカバナ		○		KgA-H169 2051
<i>E. fauriei</i>	ヒメアカバナ		○		(OM) 3296
<i>Oenothera biennis</i>	メマツヨイグサ		○		外 KgA-H107
Sapindaceae ムクロジ科					
<i>Acer australe</i>	ナンゴクミネカエデ	○	*		固 975 995 KgA-H010, -H042, -H149
<i>A. japonicum</i>	ハウチワカエデ		*		固 KgA-H148
<i>A. nipponicum</i> subsp. <i>orientale</i> var. <i>koshinense</i>	コウシンテツカエデ		*		固 (EN) KgA-H162
<i>A. ukurunduense</i>	オガラバナ	○		○	855 856 1146 1905
Brassicaceae アブラナ科					
<i>Arabidopsis kamchatica</i> subsp. <i>kamchatica</i>	ミヤマハタザオ			○	(EN) 889 KgA-H052 (Su)
<i>Arabis serrata</i> var. <i>japonica</i>	イワハタザオ	○		○	固 918 KgA-H044 (Su)
<i>Barbarea vulgaris</i>	ハルザキヤマガラシ		○		外 (OM) 3292
Polygonaceae タデ科					
<i>Aconogonon weyrichii</i> var. <i>alpinum</i>	オンタデ	○	○	○	852 893 1093 1918 KgA-H041, -H059, -H086, -H190 (Su) (OM) 4394 (Ta) 1301
<i>Bistorta officinalis</i> subsp. <i>japonica</i>	イブキトラノオ		○		(Su)
<i>B. vivipara</i>	ムカゴトラノオ		○	○	804 917 2021 KgA-H064, -H120 (Su)
<i>Fallopia japonica</i> var. <i>japonica</i>	イタドリ	○	○	○	固 851 886 942 942 1068 KgA-H021, -H082, -H125 (Su)
<i>F. japonica</i> var. <i>japonica</i> f. <i>colorans</i>	メイゲツソウ	○			1079
Caryophyllaceae ナデシコ科					
<i>Cerastium schizopetalum</i> var. <i>schizopetalum</i>	ミヤマミミナグサ			○	固 (Su)
<i>Dianthus superbus</i> var. <i>speciosus</i>	タカネナデシコ	○			1136
Cornaceae ミズキ科					
<i>Cornus canadensis</i>	ゴゼンタチバナ	○		○	824 858 895 971 KgA-H030 (O) 4167
Hydrangeaceae アジサイ科					
<i>Hydrangea paniculata</i>	ノリウツギ		○		2050
Primulaceae サクラソウ科					
<i>Lysimachia europaea</i>	ツマトリソウ	○	○	○	805 844 956 2046 KgA-H031
Diapensiaceae イワウメ科					
<i>Diapensia lapponica</i> subsp. <i>obovata</i>	イワウメ			○	(CR) KgA-H191, -H192, -H207 (Su)
<i>Schizocodon soldanelloides</i> var. <i>soldanelloides</i>	イワカガミ	○	○	○	固 801 819 835 845 898 984 KgA-H024, -H087 (O) 4145
Clethraceae リョウブ科					
<i>Clethra barbinervis</i>	リョウブ	○			1097
Ericaceae ツツジ科					
<i>Arcterica nana</i>	コメバツガザクラ	○		○	923 1903 1914
<i>Cassiope lycopodioides</i>	イワヒゲ			○	922 1920 KgA-H204, -H205 (Ta) 2394
<i>Elliottia bracteata</i>	ミヤマホツツジ	○	*	○	固 810 1090 1118 1156 1919 KgA-H150
<i>E. paniculata</i>	ホツツジ	○	○		固 1127 KgA-H139
<i>Empetrum nigrum</i> var. <i>japonicum</i>	ガンコウラン	○		○	825 904 947 1917 (OM) 4395
<i>Enkianthus campanulatus</i> var. <i>campanulatus</i>	サラサドウダン	○	*		固 849 1102 KgA-H151 (Su)
<i>Eubotryoides grayana</i>	ハナヒリノキ		○	○	固 802 KgA-H147, -H168
<i>Gaultheria pyrolloides</i>	シラタマノキ	○	○	○	897 986 1069 1083 1922 2033 (OM) 4397
<i>Hypopitys monotropa</i>	シャクジョウソウ	○			(OM) 4234
<i>Loiseleuria procumbens</i>	ミネズオウ	○		○	1119 1904 KgA-H032, -H203
<i>Monotropastrum humile</i>	ギンリョウソウ	○		○	829 906
<i>Phyllodoce nipponica</i> subsp. <i>nipponica</i>	ツガザクラ	○		○	固 896 926 964 1120 1916 KgA-H006 (Su) (OM) 4231
<i>Pyrola alpina</i>	コバノイチヤクソウ	○	○	○	固 843 871 1080 KgA-H170
<i>Rhododendron brachycarpum</i> var. <i>brachycarpum</i>	ハクサンシャクナゲ	○	○		固 813 955 987 (Su)
<i>R. degonianum</i>	アズマシャクナゲ	○	○	○	固 870
<i>R. molle</i> subsp. <i>japonicum</i>	レンジツツジ	○	*		固 806 820
<i>R. multiflorum</i> var. <i>multiflorum</i>	ウラジロヨウラク	○	○	○	固 KgA-H003

学 名	和 名	採集地			備 考
		①	②	③	
<i>R. pentandrum</i>	コヨウラクツツジ	○		○	866 928 991 (O)4144
<i>R. tschonisckii</i> subsp. <i>tschonisckii</i> var. <i>tetramerum</i>	チョウジコメツツジ			○	固 924 KgA-H174 (Su)
<i>R. tschonisckii</i> subsp. <i>tschonisckii</i> var. <i>tschonoskii</i>	コメツツジ	○			固 1101
<i>Vaccinium hirtum</i> var. <i>hirtum</i>	コウスノキ	○			固 KgA-H089
<i>V. hirtum</i> var. <i>pubescens</i>	ウスノキ	○	○	○	固 875 931 948 1103 1154 2047 KgA-H090, -H096, -H152
<i>V. ovalifolium</i> var. <i>ovalifolium</i>	クロウスゴ	○		○	912 929 932 962 KgA-H068, -H088
<i>V. smallii</i> var. <i>glabrum</i>	スノキ	○		○	KgA-H051
<i>V. smallii</i> var. <i>smallii</i>	オオバスノキ	○	*	○	796 809 913 980 1104 1155 KgA-H036, -H050, -H056, -H071
<i>V. uliginosum</i> var. <i>japonicum</i>	クロマメノキ	○	○	○	808 847 945 988 1117 KgA-H004, -H077, -H193 (O)4132
<i>V. vitis-idaea</i>	コケモモ	○	○	○	826 876 944 968 996 1066 2034 KgA-H001, -H019 (OM)4398
<i>V. yatabei</i>	ヒメウスノキ (アオジクスノキ)			○	固 KgA-H197
Rubiaceae アカネ科					
<i>Galium kamtschaticum</i> var. <i>kamtschaticum</i>	エゾノヨツバムグラ	○			1088 (O)4154
<i>G. verum</i> subsp. <i>asiaticum</i> var. <i>asiaticum</i> f. <i>luteolum</i>	キバナカワラマツバ	○			(Su)
Gentianaceae リンドウ科					
<i>Gentiana makinoi</i>	オヤマリンドウ	○		○	固 1142 (OM)4233
<i>G. triflora</i> var. <i>japonica</i>	エゾリンドウ		*		KgA-H156 (OM)3558
<i>Halenia corniculata</i>	ハナイカリ	○	○	○	1125 1170 2030 KgA-H070, -H111
<i>Tripterospermum japonicum</i> var. <i>involutibile</i>	テングノコヅチ	○			固 NT (VU)1084 (O)4162
Oleaceae モクセイ科					
<i>Fraxinus apertisquamifera</i>	ミヤマアオダモ	○	*		固 1099 KgA-H159
Plantaginaceae オオバコ科					
<i>Veronica onoei</i>	グンバイヅル	○		○	固 VU (VU)882 KgA-H016, -H054
Lamiaceae シソ科					
<i>Prunella vulgaris</i> subsp. <i>asiatica</i> var. <i>lilacina</i> f. <i>asiatica</i>	ウツボグサ		*	○	1171
<i>Thymus quinquecostatus</i> var. <i>ibukiensis</i>	イブキジャコウソウ	○	○	○	1092 1140 2037 KgA-H094
Orobanchaceae ハマウツボ科					
<i>Euphrasia insignis</i> subsp. <i>insignis</i> var. <i>togakusiensis</i>	トガクシコゴメグサ	○		○	固 1124 1157 1907 2058 KgA-H183 (O) 4137
<i>E. maximowiczii</i> var. <i>maximowiczii</i>	タチコゴメグサ	○	○	○	1076 2038 KgA-H095, -H178 (OM)3592 (Ta)2330
<i>Melampyrum roseum</i> var. <i>japonicum</i>	ママコナ			○	(Ta)395
<i>Pedicularis resupinata</i> subsp. <i>teucriifolia</i> var. <i>caespitosa</i>	トモエシオガマ			○	固 (Su)
Aquifoliaceae モチノキ科					
<i>Ilex rugosa</i> var. <i>rugosa</i>	ツルツゲ	○	○	○	867 970 KgA-H011 (O)4161
<i>I. suerokii</i> var. <i>brevipedunculata</i>	アカミノイヌツゲ	○			固 973 1131
Campanulaceae キキョウ科					
<i>Adenophora nikoensis</i> var. <i>nikoensis</i>	ヒメシャジン	○	○	○	固 2023 KgA-H109, -H165 (Su)
<i>A. triphylla</i> var. <i>japonica</i>	ツリガネニンジン	○	○	○	固 1094 1100 1163 KgA-H105, -H112, -H155 (Su)
<i>A. triphylla</i> var. <i>japonica</i> f. <i>albiflora</i>	シロバナツリガネニンジン			○	固 KgA-H101
<i>Campanula punctata</i> var. <i>hondoensis</i>	ヤマホタルブクロ	○	○	○	固 1091 2040 KgA-H084
Asteraceae キク科					
<i>Anaphalis margaritacea</i> subsp. <i>margaritacea</i> var. <i>margaritacea</i>	ヤマハハコ	○	○	○	941 1121
<i>Artemisia indica</i> var. <i>maximowiczii</i>	ヨモギ			○	KgA-H121
<i>A. monophylla</i>	ヒトツバヨモギ	○			固 (Su)
<i>A. montana</i> var. <i>montana</i>	オオヨモギ		○	○	2049 KgA-H128, -H154
<i>A. pedunculosa</i>	ミヤマオトコヨモギ			○	固 (Su)
<i>A. unalaskensis</i>	チシマヨモギ			○	1162 KgA-H175, -H181
<i>Aster glehnii</i> var. <i>hondoensis</i>	ゴマナ		○	○	固 1153 2048 KgA-H106
<i>Chrysanthemum rupestre</i>	イワイニンテン	○	○	○	固 952 994 1061 1165 2032 (Ta)599 KgA-H020, -H093 (O)4131
<i>Cirsium comosum</i> var. <i>lanuginosum</i>	ナンブアザミ		○	○	固 KgA-H171 (Su)
<i>C. dipsacolepis</i> var. <i>dipsacolepis</i>	モリアザミ		○	○	固 2056 (Su)
<i>C. japonicum</i> subsp. <i>japonicum</i> var. <i>japonicum</i>	ノアザミ	○	○	○	固 990 1158 2061 KgA-H102, -H124
<i>C. oligophyllum</i> var. <i>oligophyllum</i>	ノハラアザミ		○	○	固 1159 2062 KgA-H138
<i>C. ovalifolium</i>	オクヤマアザミ		○		固 2055
<i>C. tenuipedunculatum</i>	ホソエノアザミ			○	固 (Su)
<i>Eupatorium glehnii</i>	ヨツバヒヨドリ		○		固 KgA-H129
<i>Hieracium japonicum</i>	ミヤマコウゾリナ	○		○	固 1129 1167 (Su)
<i>Ixeridium alpicola</i>	タカネニガナ	○		○	固 966 KgA-H023, -H039
<i>I. dentatum</i> subsp. <i>nipponicum</i> var. <i>albiflorum</i> f. <i>amplifolium</i>	ハナニガナ	○			1096
<i>Leontopodium japonicum</i> var. <i>japonicum</i>	ウスユキソウ	○	○	○	989 1062 1137 2031 KgA-H131 (Su)
<i>Leucanthemum vulgare</i>	フランスギク	○	○		外 KgA-H079 (O)3285
<i>Ligularia dentata</i>	マルバダケブキ	○	○	○	2042 KgA-H130
<i>Parasenecio adenostylodes</i>	カニコウモリ	○		○	固 985 (Su) (O)4148 (Ta)539
<i>P. hastatus</i> subsp. <i>orientalis</i> var. <i>ramosus</i>	オオバコウモリ			○	固 (Su)
<i>Picris hieracioides</i> subsp. <i>japonica</i> var. <i>japonica</i>	コウゾリナ		○		2036 2054 KgA-H132
<i>Saussurea mihoko-kawakamiana</i>	トウミトウヒレン	○		○	固 1071 1135 KgA-H078, -H179, -H182 (Su) (O)4126, 4135
<i>S. mihoko-kawakamiana</i> × <i>nikoensis</i>	トウミトウヒレン×シラネアザミ	○		○	1114 1161
<i>S. nikoensis</i> var. <i>nikoensis</i>	シラネアザミ			○	固 (NT) (Su) (Ta)2303
<i>S. pulchella</i>	ヒメヒゴタイ		○		VU (CR) (Ta)814
<i>S. sagitta</i> var. <i>sagitta</i>	ヤハズトウヒレン		*		固 KgA-H160
<i>S. triptera</i> var. <i>triptera</i>	ヤハズヒゴタイ		○		固 KgA-H164
<i>S. ussuriensis</i> var. <i>ussuriensis</i>	キクアザミ		○		(EN) (Su)
<i>Senecio nemorensis</i>	キオン		*	○	1172 KgA-H144
<i>Solidago virgaurea</i> subsp. <i>asiatica</i> var. <i>asiatica</i>	アキノキリンソウ		○	○	KgA-H069, -H123
<i>S. virgaurea</i> subsp. <i>leiocarpa</i> f. <i>japonalpestris</i>	ミヤマアキノキリンソウ	○		○	1065 1160 2024 (O)4134
<i>Taraxacum officinale</i>	セイヨウタンポポ			○	外 KgA-H067

学 名	和 名	採集地			備 考 固有種, 外来種, RDB種: 県(国), 標本No.他
		①	②	③	
Adoxaceae レンブクソウ科					
<i>Viburnum furcatum</i>	オオカメノキ	○	○	○	839 993
<i>V. urceolatum</i> f. <i>procumbens</i>	ミヤマシグレ	○			固 965 KgA-H033(O)4157
Caprifoliaceae スイカズラ科					
<i>Linnaea borealis</i>	リンネソウ	○			(VU)977 1087 KgA-H029(Su) (OM)4232
<i>Patrinia triloba</i> var. <i>triloba</i>	ハクサンオミナエシ	○	*	○	固 827 892 969 1082 KgA-H022
<i>Scabiosa japonica</i> var. <i>japonica</i>	マツムシソウ	○	○	○	固 1070
Araliaceae ウコギ科					
<i>Aralia cordata</i> var. <i>cordata</i>	ウド	○	○	○	KgA-H113(O)3589(Sa)
<i>A. elata</i>	タラノキ	○			1899
<i>Chengiopanax sciadophylloides</i>	コシアブラ	○	*		固 838
<i>Oplopanax japonicus</i> var. <i>japonicus</i>	ハリブキ	○		○	固 888 1085(OM)4388
Apiaceae セリ科					
<i>Bupleurum longiradiatum</i> var. <i>elatus</i>	ホタルサイコ	○	*	○	(EN)KgA-H110, -H161(Su)
<i>B. nipponicum</i> var. <i>nipponicum</i>	ハクサンサイコ	○	○		固 2022(Su)
<i>Conioselinum filicinum</i>	ミヤマセンキュウ	○	○	○	1152 2053 KgA-H140(OM)3584
<i>Ostericum florentii</i>	ミヤマニンジン	○	○	○	固 1073 1168 KgA-H114(Mt) (OM)3585, 4391
<i>Tilingia ajanensis</i> var. <i>ajanensis</i>	シラネニンジン	○		○	(Su)
<i>T. tachiroei</i>	ミヤマウイキョウ			○	(Ta)2304

引用文献

- Ebihara, A., Ito, M., Nagamasu, H., Fujii, S., Katsuyama, T., Yonekura, Yahara, T. (2017) Fern GreenList ver. 1.01, (<http://www.rdplants.org/gl/>)
- Ito, M., Nagamasu, H., Fujii, S., Katsuyama, T., Yonekura, Ebihara, A., Yahara, T. (2016) GreenList ver. 1.01, (<http://www.rdplants.org/gl/>)
- 岩月善之助編 (2001) 日本の野生植物コケ. 560pp. 平凡社.
- 加藤雅啓・海老原淳 (2011) 日本の固有植物 (国立科学博物館叢書11). 東海大学出版会.
- 米倉浩司 (2012) 日本維管束植物目録. 379pp. 北隆館.
- 米倉浩司・梶田忠 (2003-) 「BG Plants和名一学名インデックス」(YList), <http://ylist.info>
(吉井 広始・大平 満)

3 保全（保護）の現状

(1) 調査結果の概要

2年間にわたって、浅間外輪山（鋸岳、仙人岳、蛇骨岳、黒斑山、トーミの頭）、水ノ塔山、西簗ノ登山、東簗ノ登山、高峯山の登山道周辺や、地蔵峠から高峰温泉までの林道周辺を中心に植生・植物相調査を実施した。

植生調査は、自然植生を中心に77箇所の森林や低木・草本群落などで実施し、植物社会学的な植生単位の検討を行った結果、シラビソ・オオシラビソ群集、アカミノイヌツゲ・クロベ群集、カラマツ群落、ダケカンバ群落、ミヤマハンノキ群落、チョウジコメツツジ群集、ウラシマツツジ・クロマメノキ群集、コメバツガザクラ・ミネズオウ群集、ガンコウラン群落、ツガザクラ群落、オンタデ群落、コメススキ群落、グンバイヅル群落、イタドリ群落、ニッコウザサ群落など5群集18群落の基本的植生単位が区分された。

証拠標本によって確認された維管束植物は、57科151属241種6亜種10変種0品種1雑種（258種内分類群）である。これらには、国や県指定の絶滅危惧種13種のほか、希少種が多く含まれる。

また、ニホンジカ（以下、シカ）によるコメツツジ、ズミ、ベニサラサドウダン、ミネズオウなど多種にわたる食害が認められたほか、黒斑山中コース登山道や外輪山登山道では深刻な洗掘、東簗ノ登山山頂部などでは踏みつけによる植生の荒廃などが確認された。

(2) 保全（保護）の現状

調査対象とした範囲は、上信越高原国立公園に指定されており、一部を除き人為的な痕跡の少ない亜高山針葉樹林や火山荒原などの自然植生が維持され、希少な動植物が多く生息・生育している。しかし、小諸市や上田市の市街地から車で30分程度という距離にあり、ビギナーでも手軽に2000m級の山々を楽しむことができる地域でもある。登山者や観光客の増加は、一方で自然保護意識が低くマナーも悪い者の割合も増すことを意味する。実際に林内などには、人の立ち入りによる踏み跡が多くみられ、高山植物の盗掘が懸念される。

本地域の保全にあたっては、登山道以外への立入禁止区域を厳格化したり、ミヤマシロチョウの保護事業のように高山植物等盗掘防止のための監視態勢を強化したりする必要がある。なお、登山道は整備されているが、地表面が固結しない火砕物に覆われている部分が多いため、登山者の踏みつけによる影響を受けやすい。このため、登山道の洗掘や植生荒廃地に対する適切な保全対策が望まれる。特に、黒斑山中コース登山道上部は、洗掘が顕著なため早急な対策が必要である。また、シカによる植生攪乱が進みつつあり、国や隣接する長野県を含め、行政機関間で連携した頭数調整など実効性のあるシカ管理対策が急務である。

（吉井 広始・片野 光一）