浅间山北麓地域

〔1年目〕

浅間山北麓地域〔1年目〕

調査者 植 物 大平 満、大森 威宏、片野 光一、鈴木 伸一、中澤 和則
増田 和明、吉井 広始（調査協力：嶋村 明）
動 物 荒井 堅一、岡崎 太郎、金杉 隆雄、中澤 和則、夏目 道生

1 地域の概況

群馬、長野両県の境をなす浅間山（2568m）は、日本を東西に二分するフォッサマグナのほぼ東縁に位置し、地下では3つのプレートがぶつかり合う日本列島の中でも大地の変動が最も活発な地域にある。浅間山は、近年においても中規模噴火を20年に一度程度繰り返している日本有数の活火山である。

調査対象地域は、上信越高原国立公園の第1種～第3種特別地域に指定されている標高約1200m～1700mの浅間山北麓地域一帯で、黒斑山北面の浅間高原シャクナゲ園周辺域から鬼押し出し園・長野原町営浅間園を経て六里ヶ原までの広範な地域である（図1-1）。浅間火山史上の様々な火砕流や溶岩流が露出しており、流下した年代によって成立する植生を比較することで乾性一次遷移の過程を窺い知ることができる。なお、北麓に刻まれる谷は上部のほとんどが涸れ沢であり、ある程度の降雨があれば流れが生じる水系に乏しい環境である。また、一帯は、気候的には本州中央高原型

図1-1 浅間山北麓地域調査範囲（電子国土Web地理院地図に加筆、特別地域の詳細は <https://www.env.go.jp/park/content/000103849.pdf> を参照）

- 第1種特別地域：特別保護地区に準ずる地域で、現在の景観を極力維持する必要がある地域。おおよそ鬼押し出し溶岩流と鬼押し出しハイウェイ、県境で囲まれた地域と片蓋川右岸地域。
- 第2種特別地域：良好な自然状態を保持し、農林漁業との調和を図りつつ自然景観の保護に努める必要がある地域。鬼押し出し溶岩北縁及び鬼押し出しハイウェイより東地域とシャクナゲ園上部一帯。
- 第3種特別地域：風致を維持する必要があるが比較的低い地域で、通常の農林漁業活動が風致の維持に影響を及ぼすおそれが少ない地域。鬼押し出し溶岩の西方、シャクナゲ園周辺地域。

気候域にあり、年平均気温8°C、年降水量1300~1400mm程度、最深積雪50~100cm程の冷涼寡雨な地域となっている（丸山 1987）。

現在、浅間山へ本県側から入山するルート（浅間山北面登山道）の整備計画が進められている（上毛新聞 2022）。これは、浅間園とシャクナゲ園を各登山口として延ばされた登山道が途中で合流したあとさらに長野県小諸市側からの既存ルートに結ぶというものである。同紙によると、本計画は嬭恋村と長野原町でつくる浅間山ジオパーク推進協議会の2021年改訂基本計画にも盛り込まれ、2025年度の開通に向けて整備が進められている。加えて、環境省が推進する「国立公園満喫プロジェクト」でインバウンドを意識した「自然環境の保護と利用の好循環」を謳い、高付加価値を見出して活性化を図ろうとする動きがある。また、観光庁が推進する「インバウンドの地方誘客や消費拡大に向けた観光コンテンツ造成支援事業」に北軽井沢エリアにも観光拠点をもつ長野原町の取り組みが採択されている（上毛新聞 2024）。本地域はこのような状況下にあるが、これまで植物、動物のインベントリー調査の報告は少なく、植物では須藤・片野（1979a, b）、大森（2004）、国土交通省関東地方整備局利根川水系砂防事務所（2014a, b）などがあるが、いずれも調査範囲や内容に限られ十分とは言い難い。動物ではまとまった報告書等はほとんどないのが実態である。

このような背景を踏まえ、群馬県が2021~2022年に実施した籠ノ登山、水ノ塔及び浅間山外輪山における植生及び植物相の先行調査（大平ほか 2022、2023）では、貴重種や希少種、保護すべき群落の存在が明らかにされており、動物相調査を加えた今回の調査もその一環である。

長野県軽井沢町や長野原町北軽井沢地域では、今後ますます観光開発が企図・実施されるものと思われる。国立公園の積極的な利用が是とされ、本地域の自然環境や生物相、生態系に関する十分な基礎資料がないままに開発や諸計画が進められることは、自然自体が大きな観光資源だけに危険と言わざるを得ない。

調査は2年計画の1年目で、植物は長野原町営浅間園とプリンスホテルズ&リゾートが運営する鬼押出し園、嬭恋村鎌原字藤原にある特別天然記念物浅間山熔岩樹型とその周辺域を中心に行った。動物は調査範囲内において調査対象の生息地に合わせたフィールドを選択して行ったが、ほとんど水系がないようなところでは調査範囲を拡大して行うこともあった。

調査にあたり、長野原町及び嬭恋村、鬼押出し園、上信越高原国立公園管理事務所には、町村有地・園地へ立ち入りの承諾、標本採集許可などで便宜を図っていただいた。円滑な調査ができたことを記して感謝申し上げます。

引用文献

- 上毛新聞（2022）浅間山初の本県ルート「鬼押出し」溶岩群／地質学の要地通過、25年度開通へ整備（4月6日記事：前原久美代・須永彪月）。
- 上毛新聞（2024）訪日客誘致へ観光磨く一長野原町 留学生招きモニターツアー（2月2日記事：前原久美代）。
- 国土交通省関東地方整備局利根川水系砂防事務所（2014a）植物重要種リストH24-25、浅間山砂防管内における環境調査。
- 国土交通省関東地方整備局利根川水系砂防事務所（2014b）植物調査地点別リスト H24-25、浅間山砂防管内における環境調査。
- 丸山定利（1987）2. 群馬県の気候、群馬県植物誌改訂版、17-32、群馬県・群馬県高等学校教育研究会生物部会。
- 大平 満・大森威宏・片野光一・鈴木伸一（2022）籠ノ登山（東西）、水ノ塔山及び浅間外輪山の植物〔1年目〕、良好な自然環境を有する地域学術調査報告書、48：27-20、群馬県林務部自然環境課。
- 大平 満・大森威宏・片野光一・鈴木伸一・蛭間 啓・吉井広始（2023）籠ノ登山（東西）、水ノ塔山及び浅間外輪山の植物〔2年目〕、良好な自然環境を有する地域学術調査報告書、49：3-20、群馬県林務部自然環境課。
- 大森威宏（2004）群馬県浅間山北麓における植物分布の新知見一長野県中信及び東信地域の高原と関連して、群馬県立自然史博物館研究報告、8：119-122。
- 須藤志成幸・片野光一（1979a）植生（浅間山地域）、良好な自然環境を有する地域学術調査報告

書, 5:76-82, 85. 群馬県林務部林業経営課,
須藤志成幸・片野光一(1979b) 植生(黒斑山地域). 良好な自然環境を有する地域学術調査報告
書, 5:100-103. 群馬県林務部林業経営課,

(吉井 広始)

2 植 物

(1) 調査の概況

2023年度は、浅間山が過去3回の大噴火によって形成された地形・地質をみることのできる浅間園と鬼押し園を中心に調査を実施した。古墳時代の3世紀末に流れ出した小滝火砕流や1108年(天仁元年)噴火の前掛山溶岩(上の舞台溶岩)、1783年(天明三年)噴火の鬼押し溶岩と吾妻火砕流の上にそれぞれ成立している現存植生及び植物相の把握を行った(図2-1)。加えて、調査対象範囲(図1-1)から外れるが熔岩樹型地から北方7kmの東泉沢(嬬恋村大笹)の水生植物群落と2024年度の主な調査地となる六里ヶ原の一部について春季と秋季に植物相調査を行った。植生・植物相の調査は以下の日程と場所、調査者で行われた。なお、調査にあたって、植生は鈴木・片野・吉井、維管束植物相は大平を中心に大森・吉井・増田・嶋村、コケ植物相は中澤が担当した。

[植生・植物相合同調査]

7月 7日：浅間園地遊歩道(鎌原)、特別天然記念物浅間山熔岩樹型域(鎌原字藤原)、東泉沢(大笹)[大平・片野・中澤・吉井・嶋村]

8月17日：浅間園地スカイロックトレイルコース(鎌原)、浅間高原シャクナゲ園(鎌原)[大平・片野・鈴木・増田・吉井]

9月 5日：鬼押し園遊歩道(鎌原)[大平・片野・中澤・吉井]

図2-1 調査ルート(破線)・調査域(実線)及び植生調査地点(●)(電子国土Web地理院地図に加筆)

〔植物相個人調査〕

浅間園…6月8・18日、7月2日、8月1日、9月16日、10月6・7日〔大平〕

特別天然記念物浅間山熔岩樹型域…7月17日、8月30日〔大平〕

六里ヶ原サイクリングロードとその南部及び片蓋川左岸域、鬼押し出し…6月2・12日〔大森〕

片蓋川左岸域…10月6日〔大森〕

長野原町営浅間園…4月21日〔中澤〕

(2) 植生

ア 地形・地質の概要

(ア) 浅間山の活動と北麓の地質

浅間山は、活動史上最大の噴火をした仏岩火山（活動年代は約1.7～1.1万年前（中村ほか 1997））、約2.4～2.2万年前頃に山体崩壊を起こした黒斑火山（荒牧 1993）、約8500年前に活動を開始（高橋 2003）したとされる現在の前掛火山の総称であり、複数の火山活動が黒斑火山体の破壊期を挟んで重なって生じた複式火山となっている。また、浅間山は烏帽子火山群に属し、西端の烏帽子岳（2066m）から東縁の離山（1256m）まで東西約22kmにわたって配列する第四紀火山で構成され、浅間山はそのほぼ東端に位置している（西来ほか 2013）。烏帽子火山群の活動開始年代は100万年前以降（金子ほか 1989, 1991、高橋・三宅 2004）、浅間火山の開始は10万年前以降（竹本・久保 1995）と推定されている。烏帽子火山群の火山活動史において西部地域から活動の中心が東進して現在の浅間山の活動に至ったとされる（西来ほか 2013）。噴火の型は、阿蘇山と同様に激烈な噴火が特徴のブルカノ式に属している（小林 1979）。

浅間山北麓地域の調査範囲に沿って、浅間火山の活動による地表面に露出する地質について荒牧（1993）、高橋（1998）、早川（2018）、西来ほか（2013）に基づいて概要を述べる。浅間山北麓の地表を覆う大半は1783年天明の大爆発由来の噴出物であるが、黒斑山北面の浅間高原シャクナゲ園周辺（標高約1520～1750m）には、元の山体斜面上に1.58万年前の浅間火山史上最大の噴火で流出した平原火砕流がみられる。尾根部は元の黒斑火山堆積物、谷部に平原火砕流が溜り、尾根と谷が交互に配列して楯状に分布している。標高1500mより下部は一樣に広く平原火砕流堆積物に覆われている。東経138度30分48秒付近の谷より東は1783年（天明3年）8月2日の噴火で前掛火口から北側に流出した鬼押し出し溶岩と、翌8月4日に火口から北側へ鬼押し出し溶岩流を避けるように東西に分かれて流れ下った吾妻火砕流堆積物が広範に覆っている。これにより浅間山北麓には現在に至る広大な平坦斜面ができた。また、8月5日には鬼押し出し溶岩の先端付近で起こった激しい爆発で飛散したガラス質の砂礫からなる鎌原熱雲堆積物が生じたが、浅間園の浅間山北麓ビジターセンター付近を起点として降下した堆積物が北方に2kmほど分布している。この溶岩や火砕流は、それ以前の火山活動の堆積物をほとんど覆い尽くしたが、現在浅間園のスカイロックトレイルルート沿いの一部にはそれ以前の噴火活動の堆積物がみられる。3世紀末の噴火で流れ出した小滝火砕流堆積物は、浅間山北麓ビジターセンターの南南西の谷に露出している。1108年のプリニー式噴煙柱が崩れて発生した追分火砕流は、火口の四方に流れてそれ以前の噴火による前掛山溶岩上を覆ったが、溶岩の急崖や末端崖にはその堆積物が残らなかった。北斜面では鬼押し出し溶岩や吾妻火砕流に覆われ、現在ではスカイロックトレイルルートの内側に小滝火砕流に接して下の舞台とその下部に連続して露出するのみとなっている。北麓では下の舞台や上の舞台を縁取るような溶岩流末端崖とスカイロックトレイルルートの標高1600m以上から1710m間の急崖が、追分溶岩や鬼押し出し溶岩、吾妻火砕流から免れた前掛山溶岩が露出するところとなっている。

(イ) 調査地域の地形・地質

今回の調査ルート（図2-1）と早川（2018）に基づく溶岩流と火砕流等との関係は以下に示したとおりである。

浅間園スカイロックトレッキングコースは、浅間山噴火史上の代表的な噴出物が処々にみられ、その小滝火砕流、前掛山溶岩、鬼押し出し溶岩、鎌原熱雲堆積物、吾妻火砕流上にルートがある。コースの出発点である浅間山北麓ビジターセンター周辺（標高約1400m）は鎌原熱雲堆積物に覆われている。ビジターセンターからトレッキングコースに入り南南西に延びる標高約1410mから1530m付近までの谷道の両側には小滝火砕流が露出し、下の舞台の岩崖には前掛山溶岩が見えている。この付近は右（西）側に鬼押し出し溶岩が迫り、左（東）側には前掛山溶岩の崖上に乗る追分

火砕流がみられ、狭まった急傾斜のルートには長い梯子がかけられている。これを登って進むとコースの最高地点となる標高約1700mに達する。道は東に向きを変え、600mほど前掛山溶岩が露出するルートを進む。標高約1660m付近で吾妻火砕流が表出する北東斜面を横切りながら標高約1650mから下り道となって途中で前掛山溶岩の露出する上の舞台と下の舞台の両末端崖を通ったあと標高約1380m付近で左に折れビジターセンターに戻る。この間は崖地を除きすべて吾妻火砕流の荒原上に成立した植生となっている。

浅間園と鬼押し出し園の周回遊歩道は、鬼押し出し溶岩の荒涼とした奇岩や谷を避けながら縫うように付けられており、様々な遷移途上の植生をみることができる。また、鎌原字藤原の熔岩樹型は灼熱の吾妻火砕流によって、かつて成立していた樹林が吞まれて樹型が残ったものである。熔岩樹型といわれるが火砕流によって形成されたものである。嬭恋村大笹の東泉沢は、追分火砕流が表出する斜面を刻む清流で湧水を源流としている。浅間山火山荒原は、ほとんど人為に触れることなく自然の営みの中で進む乾性一次遷移の過程をつぶさにみることができる貴重な場となっている。

イ 植生概要

(ア) 植生概要

図2-1に示したとおり2023年度は浅間園の周回遊歩道とスカイロックトレッキングコース、鬼出し園の遊歩道、嬭恋村大笹の東泉沢で1箇所（図1-1、調査対象地域外）の調査を行った。

森林植生としては、標高1450m以上の小滝火砕流上にはダケカンバ群落のみられ、1550m付近になるとカラマツが優占する群落のみられるようになる。溶岩末端崖下の広い尾根状地となったところや標高1430m以下の吾妻火砕流上には樹高18～22mのアカマツ高木林（図2-2、表2-2）が比較的広くみられる。出現種数も19～45種と多く明るい林床を裏付けている。小滝火砕流上の標高約1405mやスカイロックトレイルルートの標高1520m付近の前掛山溶岩露出部は、ダケカンバが優占しサビバナナカマドが比較的高い被度で混じるダケカンバ群落（図2-3、表2-2）となっている。また、標高1650～1700m付近の前掛山溶岩上には、広がりを持つガンコウラン-ミヤマヤシャブシ群落（図2-4、表2-2）や、ダケカンバが混生せずシラネウラボに林床が覆われるサビバナナカマド群落（図2-5、表2-2）が成立している。その林縁部の火山砂礫地には、クロマメノキやガンコウランが密生する群落のみられる（図2-6、表2-3）。また、大きな噴石が地表に落下、衝突した際にできたクレーターのある荒原は、未だにカラマツの低木が疎らに生える程度である（図2-7）。標高約1380～1410mの吾妻火砕流上には一部まとまったミズナラ林（未調査）が成立しているところもある。スカイロックトレッキングコース下部は、緩斜面に加え比較的豊かな腐植層が形成されつつある土壌で、ミヤマウズラやミヤマモジブリも生える適湿地となっている。

1783年（天明3年）の噴火から240年を経た現在でも、浅間園や鬼押し出し溶岩上では土壌生成が未だ進んでいないところがあり、シモフリゴケ群落、ハイイロキゴケ群落、地衣類のハナゴケ群落（図2-8、表2-3）などがいずれも他に混生種をもたず単独で群落を形成しており、特に鬼押し出し園内に顕著にみられる。起伏の激しい溶岩地形の立地は草本群落に乏しく、遊歩道沿いにコマスキ群落やウシノケグサ群落、グンバイヅル群落（図2-9、表2-3）が小面積で成立するのみであり、遊歩道脇の一部、浅い砂質土上にはイトハナビテンツキが認められた。比較的なだらかな傾斜地の凹地や溶岩の間など土壌が堆積したところには、チョウジコメツツジ群集（図2-10、表2-3）やヒカゲツツジ群落（図2-11、表2-3）が成立している。チョウジコメツツジ群集は、山頂付近の風衝岩角地を立地とし黒斑山では樹高20cm程度の本群落が調査されている（大平ほか 2023）。浅間園や鬼押し出し園で調査された植分は、群落高が100cmにもなる草本層と低木層の2層か単層の構造で、ミヤマヤシャブシ、クロマメノキ、ホツツジ、ウラジロヨウラク、イワカガミなどを混じるがシモフリゴケやコスギバゴケの植被も少なくない。浅間高原ではチョウジコメツツジが優勢であるが、コメツツジも一部に生育する。また、県内の多野山地や足尾山地など古い地質帯に多くみられるヒカゲツツジが新しい火山地帯に入り込んで密な群落を形成しているのも特徴的である。鬼押し出し園ではミヤマヤシャブシ、アカマツ、カラマツ、ノリウツギ等の低木が管理伐採されているが、土壌堆積地自体が少ないため、これらの低木は谷間や崖上の転石地以外では未だ疎らである。溶岩上の割れ目や隙間、テラス状地の薄い土壌しかないところや林縁部、標高1700mの火山荒原などには、コメバツガザクラ-ミネズオウ群集（図2-12、表2-3）やツガザクラ、ガンコウラン、コケモモなどの各群落のみられる。一部溶岩上にはイワヒゲ群落が生育する（図2-13、表

図2-2 アカマツ群落
(小滝火砕流上 alt.1435m)

図2-3 ダケカンバ群落
(小滝火砕流上 alt.1520m)

図2-4 ガンコウラン-ミヤマヤシャブシ群落
(前掛山溶岩上 alt.1650m)

図2-5 サビバナナカマド群落
(前掛山溶岩上 alt.1670m)

図2-6 クロマメノキ群落
(鬼押し溶岩上 alt.1680m)

図2-7 鬼押し溶岩フロントと下部の吾妻火砕流上のカラマツ疎林 (トレイルルート alt.1620m)

図2-8 ハナゴケ群落
(鬼押し園 alt.1345m)

図2-9 グンバイヅル群落
(鬼押し園 alt.1340m)

図2-10 チョウジコメツツジ群集
(鬼押し園 alt.1345m)

図2-11 ヒカゲツツジ群落
(鬼押し園 alt.1350m)

図2-12 コメバツガザクラミネズオウ群集
(鬼押し園 alt.1345m)

図2-13 イワヒゲ群落 (浅間園 alt.1430m)

2-3)。火山荒原では標高1350～1700m程度の鬼押し園や浅間園でも高山風衝矮小低木群落が多くみられ、起伏に富む溶岩地形や浮動性のある砂礫に覆われるため未だ土壤形成が十分に進まず風衝草原が発達していない。

浅間山にはカラマツが優占する特徴的な自然林が広く分布している。しかし、その植生に関する報告は、小浅間山周辺や車坂峠、および黒斑山の火口底の湯ノ平周辺のカラマツ林について述べた前田・浅沼・谷本（1978）以外には見当たらない。群馬県側のカラマツ群落については、本調査の一環で行った大平ほか（2022、2023）での報告があるに過ぎない。今回も浅間園やスカイロックトレイルルートで植生データを得たが、植物社会学的な検討の結果、ガンコウランーミヤマヤシャブシ群落のヒメコマツ下位単位に含まれた。日本には数多の活火山があるが、動植物に関する基礎調査資料は一部の火山や島嶼に限られ、比較できる資料がほとんどないのが実態である。浅間山の植生遷移過程を説明するには、カラマツ林に限らず様々な植分の植生データがさらに必要になる。来年度に新たな調査データが加わることで今回報告した群落単位が変わる可能性もあることを付記しておく。

（イ）その他

調査範囲から外れるが、東泉沢の流水中にバイカモ群落（表2-4）がみられた。群馬県内では、他に尾瀬地域や日光白根山地域などに知られるが、詳細には調べられていない。県内にはイチョウバイカモも分布するので、東泉沢の個体群についても6～9月期に幾度か観察したが、分類の鍵となる浮葉がみられなかったためバイカモとした。イチョウバイカモと確定した個体群でも浮葉がまったく観察されなくなる例もあることから、今後も観察を継続する必要がある。本種は特に絶滅危惧種等の指定はないが、清流にみられる希少かつ貴重な群落である。

イ 植生調査

植生調査は、Braun-Blanquet（1964）の植物社会学的方法により、図2-1に示した浅間園の周回遊歩道とスカイロックトレッキングコースに沿って22カ所、鬼出し園の周回遊歩道沿いで13カ

所、孀恋村大笹の東泉沢で1カ所の計36カ所で実施した。植生調査資料にもとづいて植物社会学的な植生単位の検討を行った結果、表2-1～2-4に示す基本植生単位が区分された（鈴木）。なお、群落組成表の維管束植物の学名は「植物和名－学名インデックス YList」（米倉・梶田 2003-）、コケ植物の学名はマゴケ植物門をSuzuki（2016）に、ゼニゴケ植物門を片桐・古木（2018）に従ったが、マゴケ植物門のクロカワキゴケ属とエゾスナゴケ属については出口ほか（2020）に依った。

表2-1 調査地域における植物群落目録

ブナクラス <i>Fagetea crenatae</i> Miyawaki, Ohba <i>et</i> Murase 1964
コナラ－ミズナラオーダー <i>Quercetalia serrato-grosseserratae</i> Miyawaki <i>et al.</i> 1971
ミヤマザクラ－ミズナラ群団 <i>Pruno-Quercion mongolicae grosseserratae</i> Wada 1982
サビバナナカマド群落 <i>Sorbus commixta</i> var. <i>rufo-ferruginea</i> community
ダケカンバ群落 <i>Betula ermanii</i> community (表2-2)
アカマツ群落 <i>Pinus densiflora</i> community (表2-2)
エイランタイ－ミネズオウクラス <i>Cetrario-Loiseleurietea</i> Suz.-Tok. <i>et</i> Umezu 1964
コメバツガザクラオーダー <i>Arcterietalia</i> Suz.-Tok. <i>et</i> Umezu 1964
コメバツガザクラ群団 <i>Arcterion</i> Suz.-Tok. <i>et</i> Umezu 1964
コメバツガザクラ－ミネズオウ群集 <i>Arcterico-Loiseleurietum procumbentis</i> Ohba ex Suz.-Tok. 1964 (表2-3)
ツガザクラ群落 <i>Phyllodoce nipponica</i> community (表2-3)
ガンコウラン群落 <i>Empetrum nigrum</i> var. <i>japonicum</i> community (表2-3)
クロマメノキ群落 <i>Vaccinium uliginosum</i> var. <i>japonicum</i> community (表2-3)
イワヒゲ群落 <i>Cassiope lycopodioides</i> community (表2-3)
コメツツジ－ハコネコメツツジクラス <i>Rhododendreteia tschonoskii-tusiosphylli</i> Ohba 1973
コメツツジ－ハコネコメツツジオーダー <i>Rhododendretalia tschonoskii-tusiosphylli</i> Ohba 1973
ツガザクラ群団 <i>Phyllodocion nipponicae</i> Miyawaki <i>et al.</i> 1968
チョウジコメツツジ群集 <i>Rhododendretum tschonoskii tetrameri</i> Ohba 1973 (表2-3)
ヒルムシロクラス <i>Potametea</i> Tx. <i>et</i> Prsg. 1942
ヒルムシロオーダー <i>Potametalia</i> W. Koch 1926
ヒツジクサ群団 <i>Nymphaeion Oberdorfer</i> 1957
バイカモ群落 <i>Ranunculus nipponicus</i> var. <i>submersus</i> community (表2-4)
上級単位は未決定
ガンコウラン－ミヤマヤシャブシ群落 <i>Empetrum nigrum</i> var. <i>japonicum-Alnus firma</i> f. <i>hirtella</i> community (表2-2)
ヒカゲツツジ群落 <i>Rhododendron keiskei</i> community (表2-3)
コケモモ群落 <i>Vaccinium vitis-idaea</i> community (表2-3)
ハナゴケ群落 <i>Cladonia rangiferina</i> community (表2-3)
ハイイロキゴケ群落 <i>Stereocaulon vesuvianum</i> community (表2-3)
シモフリゴケ群落 <i>Racomitrium lanuginosum</i> community (表2-3)
コメススキ群落 <i>Avenella flexuosa</i> community (表2-3)
グンバイヅル群落 <i>Veronica onoei</i> community (表2-3)
ウシノケグサ群落 <i>Festuca ovina</i> community (表2-3)

表2-2 森林群落 (1)

1. *Empetrum nigrum* var. *japonicum*-*Alnus firma* f. *hirtella* community
  - a. *typicum*
  - b. under unit with *Pinus parviflora* var. *parviflora*
    - b1. under unit with *Racomitrium lanuginosum*
    - b2. under unit with *Sorbus commixta* var. *rufo-ferruginea*
2. *Sorbus commixta* var. *rufo-ferruginea* community
3. *Betula ermanii* community
4. *Pinus densiflora* community

- ガンコウラン-ミヤマシャブシ群落
 典型下位単位
 ヒメコマツ下位単位
 シモフリゴケ下位単位
 サビバナナカマド下位単位
 サビバナナカマド群落
 ダケカンバ群落
 アカマツ群落

Vegetation units	植生単位	1														2	3	4
		a		b														
				b1			b2											
Serial number	通し番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Stand number	調査番号	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023			
Date of relevé	調査年月日	25	23	22	10	8	20	19	16	18	15	1	2	14	12			
Locality	調査地	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023			
Altitude(m)	標高	9	8	8	7	7	8	8	8	8	8	7	7	8	7			
Slope direction	方位	5	17	17	7	7	17	17	17	17	17	7	7	17	7			
Slope inclination(°)	傾斜	鬼	トス	トス	浅	浅	トス	トス	トス	トス	トス	浅	浅	トス	浅			
Quadrat size(m ²)	調査面積	押	レカ	レカ	間	間	レカ	レカ	レカ	レカ	間	間	レカ	間	間			
Tree-1 layer(m)	高木層の高さ	出し	イル	イル	園	園	イル	イル	イル	イル	園	園	イル	園	園			
Tree-1 layer(%)	高木層の植被率	し	ル	ル	ト	ト	ル	ル	ル	ル	ト	ト	ル	ト	ト			
Tree-2 layer(m)	亜高木層の高さ	園	ル	ル	ト	ト	ル	ル	ル	ル	ト	ト	ル	ト	ト			
Tree-2 layer(%)	亜高木層の植被率	ト	ト	ト	ト	ト	ト	ト	ト	ト	ト	ト	ト	ト	ト			
Shrub layer(m)	低木層の高さ	ト	ト	ト	ト	ト	ト	ト	ト	ト	ト	ト	ト	ト	ト			
Shrub layer(%)	低木層の植被率	ト	ト	ト	ト	ト	ト	ト	ト	ト	ト	ト	ト	ト	ト			
Herb layer(m)	草本層の高さ	ト	ト	ト	ト	ト	ト	ト	ト	ト	ト	ト	ト	ト	ト			
Herb layer(%)	草本層の植被率	ト	ト	ト	ト	ト	ト	ト	ト	ト	ト	ト	ト	ト	ト			
Moss layer(%)	コケ層の植被率	ト	ト	ト	ト	ト	ト	ト	ト	ト	ト	ト	ト	ト	ト			
Number of species	出現種数	ト	ト	ト	ト	ト	ト	ト	ト	ト	ト	ト	ト	ト	ト			
Differential species of community	群落区分種																	
<i>Empetrum nigrum</i> var. <i>japonicum</i>	ガンコウラン	H	+	3・3	3・3	2・2	1・2	5・5	+・2	+	・	・	・	・	・	・	・	8
<i>Vaccinium uliginosum</i> var. <i>japonicum</i>	クロメナキ	S	・	・	・	+・2	+・2	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	7
<i>Carex oxyandra</i>	ヒメガ	H	・	2・2	+	+	+・2	+	2・2	1・2	・	・	・	・	・	・	・	5
Differential species of under unit	下位単位区分種																	
<i>Pinus parviflora</i> var. <i>parviflora</i>	ヒメコマツ	T1, T2	・	・	・	・	+	・	1・1	・	±	・	+	・	・	±	・	9
<i>Vaccinium vitis-idaea</i>	コケ	H	・	・	・	・	+	+	+	+	・	・	+	+	+	+	+	8
<i>Athyrium yokoscense</i>	ヘビノネゴザ	H	・	・	・	2・2	・	・	3・3	+・2	+	・	+・2	+	+	+	+	5
Differential species of under unit	下位単位区分種																	
<i>Cladonia rangiferina</i>	バコケ	M	・	2・2	2・2	+	+	+	+	+	・	・	・	・	・	・	・	4
<i>Racomitrium lanuginosum</i>	シモフリゴケ	M	・	・	・	+・2	2・2	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	2
<i>Cephalozia otaruensis</i>	オタルヘネゴケ	M	・	・	・	+	+	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	2
<i>Phyllodoce nipponica</i>	フガザクラ	H	・	・	・	+	+	・	+	+	・	・	・	・	・	・	・	3
Differential species of under unit	下位単位区分種																	
<i>Sorbus commixta</i> var. <i>rufo-ferruginea</i>	サビバナナカマド	T1	・	・	・	・	・	・	・	・	5・5	3・3	・	+	・	・	・	8
<i>Dryopteris expansa</i>	シラネアザミ	T2	・	・	・	・	・	・	+	1・2	・	1・2	2・2	2・2	2・2	・	・	5
<i>Avenella flexuosa</i>	コススギ	S	・	・	・	・	・	・	+	+	+	・	・	・	・	・	・	2
Differential species of community	群落区分種																	
<i>Betula ermanii</i>	ダケカンバ	T1	・	・	・	・	・	・	・	・	・	3・3	4・4	・	1・2	・	・	6
<i>Rhododendron pentandrum</i>	コヨウケツツジ	T2	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	1・2	・	・	+	・	3
<i>Thelypteris phegopteris</i>	ミヤマアザミ	S	・	・	・	・	・	・	・	・	・	+	+	+	+	+	+	2
<i>Viburnum furcatum</i>	オカメナキ	H	・	・	・	・	・	・	・	・	・	+	+	+	+	+	+	3
Differential species of community	群落区分種																	
<i>Pinus densiflora</i>	アカマツ	T1, T2, S	1・2	・	±	・	・	±	・	・	・	・	・	3・3	4・4	4・4	・	8
<i>Toxicodendron trichocarpum</i>	ヤマウルシ	H	・	+	・	1・2	+	・	・	・	・	・	・	・	・	+	+	4
<i>Acer rufinerve</i>	ウリハダカイテ	S	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	+	+	+	+	+	2
<i>Osmundastrum cinnamomeum</i> var. <i>fokiense</i>	ヤマトリビソマイ	T2	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	2
<i>Elliottia paniculata</i>	ホソツツジ	H	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	+	+	3
<i>Dryopteris crassirhizoma</i>	オシダ	S	4・4	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	+	+	3
Species of Faqetea crenatae	ブナクラスの種	H	+	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	+	+	3
<i>Alnus firma</i> f. <i>hirtella</i>	ミヤマシャブシ	T1, T2	2・2	・	・	・	1・1	・	5・5	1・2	±	±	・	・	・	・	1・2	9
<i>Clethra barbinervis</i>	リョウブ	S, H, T2	+	・	(+)	4・3	+	3・3	・	+	・	・	±	・	・	1・2	・	5

表2-3 コケ群落、草本群落および低木群落

		1. <i>Cladonia rangiferina</i> community 2. <i>Stereocaulon vesuvianum</i> community 3. <i>Racomitrium lanuginosum</i> community 4. <i>Avenella flexuosa</i> community 5. <i>Veronica onoei</i> community 6. <i>Festuca ovina</i> community 7. <i>Rhododendretum tschonoskii</i> tetrameris										8. <i>Rhododendron keiskei</i> community 9. <i>Cassiope lycopodioides</i> community 10. <i>Phyllocladus nipponica</i> community 11. <i>Arctericia-loiseleurietum procumbentis</i> 12. <i>Vaccinium vitis-idaea</i> community 13. <i>Empetrum nigrum</i> var. <i>japonicum</i> community 14. <i>Vaccinium uliginosum</i> var. <i>japonicum</i> community										ヒガサツツジ群落 イワヒゲ群落 ツガザクラ群落 コメバツガザクラ-ミネズオウ群集 コケモ群落 ガンコウラン群落 クロマメノキ群落									
Vegetation units	植生単位	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18												
Serial number	連し番号	1	2	3	4	5	6	14	15	16	7	8	13	12	11	9	10	21	20	19	17	18									
Stand number	調査番号	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023									
Date of relevé	調査年月日	31	29	28	30	34	35	3	27	24	7	36	4	33	5	6	32	17	21	11	9	26									
Locality	調査地	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023									
Altitude(m)	標高	9	9	9	9	9	9	7	9	9	7	9	7	9	7	7	9	8	8	7	7	9									
Slope direction	方位	5	5	5	5	5	5	7	5	5	7	5	7	5	7	5	17	17	17	7	7	5									
Slope inclination(°)	傾斜	鬼	鬼	鬼	鬼	鬼	鬼	浅	鬼	鬼	浅	鬼	浅	浅	浅	鬼	ト	ト	ト	浅	浅	鬼									
Quadrat size(m)	調査面積	出	出	出	出	出	出	間	出	出	間	出	間	間	間	出	ル	ル	ル	間	間	出									
Shrub layer(m)	低木層の高さ	し	し	し	し	し	し	園	し	し	園	し	園	園	園	し	ト	ト	ト	園	園	し									
Shrub layer(%)	低木層の積被率	園	園	園	園	園	園	園	園	園	園	園	園	園	園	園	園	園	園	園	園	園									
Herb layer(m)	草本層の高さ	園	園	園	園	園	園	園	園	園	園	園	園	園	園	園	園	園	園	園	園	園									
Herb layer(%)	草本層の積被率	園	園	園	園	園	園	園	園	園	園	園	園	園	園	園	園	園	園	園	園	園									
Moss layer(%)	コケ層の積被率	園	園	園	園	園	園	園	園	園	園	園	園	園	園	園	園	園	園	園	園	園									
Number of species	出現種数	1	1	1	4	5	6	8	8	5	4	6	3	7	4	7	5	1	2	9	3										
Differential species of community	群落区分種																														
<i>Cladonia rangiferina</i>	ハコケ	M	5-5													2-2						4									
Differential species of community	群落区分種																														
<i>Stereocaulon vesuvianum</i>	ハコゴケ	M		5-5							1-2											2									
Differential species of community	群落区分種																														
<i>Avenella flexuosa</i>	コメバツ	H			2-3																	1									
Differential species of community	群落区分種																														
<i>Carex oxycarpa</i>	ヒメガ	H			2-2																	2									
Differential species of community	群落区分種																														
<i>Veronica onoei</i>	グンバイ	H				2-2																1									
Differential species of community	群落区分種																														
<i>Racomitrium barbuloides</i>	コメバツ	M				5-5	2-2															2									
Differential species of community	群落区分種																														
<i>Festuca ovina</i>	グンバイ	H						3-3														1									
Differential species of community	群落区分種																														
<i>Solidago virgaurea</i> subsp. <i>asiatica</i>	ツバキ	H						1-2														1									
Differential species of community	群落区分種																														
<i>Polygonatum humile</i>	ヒメイ	H					1-1															1									
Differential species of community	群落区分種																														
<i>Rhododendron tetramerum</i>	ツバキ	S							5-5													2									
Differential species of community	群落区分種																														
<i>Rhododendron keiskei</i>	ツバキ	H									5-5											1									
Differential species of community	群落区分種																														
<i>Cassiope lycopodioides</i>	ツバキ	H										5-5	4-4									2									
Differential species of community	群落区分種																														
<i>Phyllocladus nipponica</i>	ツバキ	H											5-5	4-4								5									
Character species of association	群集標徴種																														
<i>Arctericia nana</i>	コメバツ	H												3-3	5-5	+2	3-3					4									
Differential species of community	群落区分種																														
<i>Loiseleuria procumbens</i>	ミズ	H													5-5	4-4						2									
Differential species of community	群落区分種																														
<i>Vaccinium uliginosum</i> var. <i>japonicum</i>	クロマメ	H						2-2									5-5					3									
Differential species of community	群落区分種																														
<i>Empetrum nigrum</i> var. <i>japonicum</i>	ガンコウ	H								+2									5-5	4-4			5								
Differential species of community	群落区分種																														
<i>Vaccinium vitis-idaea</i>	ツバキ	H																		4-4	5-5	1-2	3								
Differential species of community	群落区分種																														
<i>Gaultheria pyrolloides</i>	ツバキ	H																			1-2	5-5	2								
Differential species of community	群落区分種																														
<i>Pinus densiflora</i>	ツバキ	H																				+	+	2							
Companions	随伴種																														
<i>Racomitrium lanuginosum</i>	ハコケ	M			5-5	5-5			2-2			4-4		2-2									9								
Differential species of community	群落区分種																														
<i>Schizocodon soldanelloides</i> var. <i>soldanelloides</i>	ツバキ	H													1-2		1-2					7									
Differential species of community	群落区分種																														
<i>Alnus firma</i> f. <i>hirtella</i>	ミヤマ	S.H														1-2						(1)									
Differential species of community	群落区分種																														
<i>Rhododendron multiflorum</i>	ツバキ	S.H																													
Differential species of community	群落区分種																														
<i>Polytrichum commune</i>	ツバキ	M																													
Differential species of community	群落区分種																														
<i>Gollania ruginosa</i>	ツバキ	M																													
Differential species of community	群落区分種																														
<i>Salix reinii</i>	ツバキ	H																													
Differential species of community	群落区分種																														
<i>Kurzia makinoana</i>	ツバキ	M							3-3					2-2									2								
Differential species of community	群落区分種																														
<i>Rhododendron brachycarpum</i>	ツバキ	H																													
Differential species of community	群落区分種																														
<i>Elliottia paniculata</i>	ツバキ	S.H							2-2	1-2													2								

出現一回の種 Species of one relevé only in no.5: *Campanula punctata* var. *hondoensis* ツバキ H+, 7: *Diplophyllum plicatum* ツバキ M+, *Tortella japonica* ツバキ M+, 8: *Hydrangea paniculata* ツバキ S+, *Rhododendron wadanum* ツバキ S+, 9: *Larix kaempferi* ツバキ H+, *Hypnum subimponens* subsp. *ulophyllum* ツバキ M-1-2, 10: *Gymnomitrium coralloides* ツバキ S+, 11: *Scapania parvirens* ツバキ M+, 14: *Clethra barbinervis* ツバキ H+, 17: *Fallopia japonica* ツバキ H+, *Sorbus commixta* var. *rufo-ferruginea* ツバキ H+, *Acer micranthum* ツバキ H+, *Miscanthus sinensis* ツバキ H+, *Tilingia ajanensis* ツバキ H+, 18: *Malus toringo* ツバキ H+, 21: *Pinus parviflora* var. *parviflora* ツバキ H+.

表2-4 水生植物群落

Ranunculus nipponicus var. *submersus* community バイカモ群落

Stand number	調査番号	2023
		13
Date of relevé	調査年月日	2023
		7
		7
Locality	調査地	東泉沢
Altitude(m)	標高	1150
Quadrat size(m ²)	調査面積	1
Depth of water(cm)	水深	20
Herb layer(%)	草本層の植被率	95
Moss layer(%)	コケ層の植被率	20
Number of species	出現種数	2
Differential species of community	群落区分種	
<i>Ranunculus nipponicus</i> var. <i>submersus</i>	ハ [*] イカモ	H 5・5
<i>Fontinalis antipyretica</i>	カカコケ	M 2・2

引用文献

- 荒牧重雄 (1993) 浅間火山地質図. 地質調査所.
- Braun-Blanquet, J. (1964) Pflanzensoziologie, Grundzüge der Vegetationskunde. 3ed. Spriger-Verlag, 865pp. Wien and New York.
- 出口博則・井上侑哉・坪田博美・H. ベドナレク-オヒラ・R. オヒラ (2020) : 日本産シモフリゴケ類の分類
- 早川由起夫 (2018) 浅間火山北麓の2万5000分の1地質図 2018年第三版. 長野原町営浅間園.
- 金子隆之・清水 智・板谷徹丸 (1989) K-Ar年代からみた信越高原地域の火山活動. 岩鉱, 84 : 211-225.
- 金子隆之・清水 智・板谷徹丸 (1991) 信越高原地域に分布する第四紀火山のK-Ar年代と形成史. 震研彙報, 66 : 299-332.
- 片桐知之・古木達郎 (2018) 日本産タイ類・ツノゴケ類チェックリスト, 2018. Hattoria 9 : 53-102.
- 小林二三雄 (1979) 浅間山. 群馬の山, 235-243. 上毛新聞社.
- 前田禎三・浅沼晟吾・谷本丈夫 (1978) 浅間山のカラマツ天然林の植生と遷移. 森林立地, 19 : 1-9.
- 中村俊夫・辻誠一郎・竹本弘幸・池田晃子 (1997) 長野県, 南軽井沢周辺の更新世最末期の浅間テフラ層の加速器¹⁴C年代測定. 地質学雑誌, 103 : 990-993.
- 西来邦章・高橋 康・松本哲一 (2013) 浅間・烏帽子火山群の火山活動場の変遷. 地質学雑誌, 119 : 474-487.
- 大平 満・大森威宏・片野光一・鈴木伸一 (2022) 籠ノ登山 (東西), 水ノ塔山及び浅間外輪山の植物〔1年目〕. 良好な自然環境を有する地域学術調査報告書, 48 : 27-20. 群馬県林務部自然環境課.
- 大平 満・大森威宏・片野光一・鈴木伸一・蛭間 啓・吉井広始 (2023) 籠ノ登山 (東西), 水ノ塔山及び浅間外輪山の植物〔2年目〕. 良好な自然環境を有する地域学術調査報告書, 49 : 3-20. 群馬県林務部自然環境課.
- Suzuki, T (2016) A Revised New Catalog of the Mosses of Japan. Hattoria 7: 9-223.

- 高橋 康 (2004) 長野県北東部烏帽子岳とその周辺の地質と火山形成史. 火山, 49: 83-102.
- 高橋 康・三宅康幸 (2004) 上信地域烏帽子岳西麓の溶岩類のK-Ar年代. 火山, 49: 207-212.
- 高橋正樹 (1998) 浅間火山—天明大噴火の爪あと. 関東甲信越の火山I. フィールドガイド日本の火山1, 93-118. 築地書館.
- 竹本弘幸・久保誠二 (1995) 群馬の火山灰. 180pp. みやま文庫.
- 米倉浩司・梶田 忠 (2003-) 「BG Plants 和名—学名インデックス」(YList) 2021年5月14日, <http://ylist.info> (2024年1月20日).

(吉井 広始・鈴木 伸一・片野 光一)

(3) 植物相

両園内のルート沿いと熔岩樹型域について目視と標本採取、写真撮影による植物相の把握に努めた。浅間山北麓における植物相に関する報告・記録、出版本がいくつか知られるが、どれも断片的でまとまったものはない。またコケ植物の報告は、これまで地域としてまとめられたものはない。

火山荒原群落や風衝草原、風衝矮生低木群落を構成する植物が特徴的である。また、凹凸の起伏が激しい鬼押し溶岩上の植物相は、比較的新しい火山噴火によりまったくの裸地からスタートしていることや現在においても植物が生育するには厳しい立地であるため貧弱である。加えて、火山裸地から今に至る240年間で分化した固有種がないことも特徴と言える。孀恋村大笹の東泉沢にバイカモが自生する。県内にはイチョウバイカモも知られるため季節を変えて観察を続けているが未だに浮葉が認められないことからバイカモとした。

ア 浅間山北麓地域の維管束植物仮目録

- 調査者：大平 満 Ohdaira, Mitsuru・大森威宏 Ohmori, Takehiro・吉井広始 Yoshii, Hiroshi・増田和明 Masuda, Kazuaki・嶋村 明 Shimamura, Akira
- 調査方法及び調査日と調査地〔調査者〕
調査は、主に登山道沿いを中心に徒歩での目視と標本採集、写真撮影により行った。
○ 2023年 7月 7日：浅間園地（鎌原）、特別天然記念物熔岩樹型域（鎌原）、東泉沢（大笹）〔大平・吉井・嶋村〕
○ 2023年 8月17日：浅間園スカイロックトレイルコース（鎌原）、シャクナゲ園（鎌原）〔大平・吉井・増田〕
○ 2023年 9月 5日：鬼押し園地（鎌原）〔大平・吉井〕
○ 2023年 個人調査：浅間園地…6/8・18、7/2、8/1、9/16、10/6・7、特別天然記念物浅間山熔岩樹型域…7/17、8/30〔大平〕
六里ヶ原サイクリングロードとその南部及び片蓋川左岸域、鬼押し…6/2・12、片蓋川左岸域…10/6〔大森〕
- 結果、維管束植物では70科200属289種2亜種8変種1品種1雑種（301種内分類群）として整理された。記録された289種における固有率は21.1%である。国外外来種は10科20種が認められ、帰化率7.0%である。証拠標本は、最終的に群馬県立自然史博物館のハーバリウム（GMNHJ）に収蔵される。なお、大平の標本については大森が最終的に確認を行った。
- 本目録の科の配列及び学名は、先行調査の大平ほか（2022, 2023）との整合を図るため日本維管束植物目録（米倉 2012）により統一し、属・種はすべてアルファベット順に配列した。
備考欄：固：日本固有種、外：国外外来種、RD：県（国）〔CR；絶滅危惧IA類, EN；絶滅危惧IB類, VU；絶滅危惧II類, NT；準絶滅危惧〕ランクは環境省レッドリスト2020、群馬県の植物レッドリスト2022改訂版による。
標本番号；〔4桁の数字は大平、5桁は大森、AsNfを伴う数字は吉井の採集品〕、無番は写真撮影のみだが、同定に必要な落葉や生葉、果実などの部分採取を行ったものもある。
採集地及び確認地略号：A；浅間園, O；鬼押し園と周辺, L；熔岩樹型, H；浅間高原, I；東泉沢, R；六里ヶ原サイクリングロードとその南部, K；片蓋川左岸
- 本地域の調査は2年計画の1年目につき仮目録とし、2024年度の調査結果と合わせて本目録とする。

学名	和名	備考	採集地・採集・確認日(2023)							
			採略号	6	7	8	9	10		
				2 8 1218	2 7 17	1 1730	5 16	6		
LYCOPHYTA ヒカゲノカズラ類(小葉類)										
Lycopodiaceae ヒカゲノカズラ科		2588, 2596, 17711	AF	*						*
<i>Lycopodium clavatum</i>	ヒカゲノカズラ	2588, 2596, 17711	AF	*						*
<i>L. complanatum</i>	アスヒカズラ	2714, 17712	AF		*					*
<i>L. dendroideum</i>	マンネンシギ	2591, 17702	AF	*						*
Ophioglossaceae ハナヤスリ科										
<i>Botrychium multifidum</i> var. <i>robustum</i>	エゾフユノハナワラビ	3074, 3121	AO				*	*	*	
Equisetaceae トクサ科										
<i>Equisetum arvense</i> f. <i>arvense</i>	スギナ	2572	A	*						
Osmundaceae ゼンマイ科										
<i>Osmundastrum cinnamomeum</i> var. <i>fokiense</i>	ヤマドリゼンマイ	2573	A	*		*	*			
Dennstaedtiaceae コバノイシカグマ科										
<i>Dennstaedtia hirsuta</i>	イヌシダ	2551, 2795, 2970	A	*		*	*			
<i>D. wilfordii</i>	オウレンシダ	2743	A		*					
<i>Pteridium aquilinum</i> subsp. <i>japonicum</i>	ワラビ	2840	L			*				
Thelypteridaceae ヒメシダ科										
<i>Thelypteris musashiensis</i>	イワハリガネワラビ	2839	L			*				
<i>T. palustris</i>	ヒメシダ	2569	A	*						
<i>T. phegopteris</i>	ミヤマワラビ	2483, 2534	A	*		*	*			
Woodsiaceae イワデンダ科										
<i>Athyrium yokoscense</i>	ヘビノネゴザ	2484, 2538, 3056	AO	*		*	*	*		
Onocleaceae コウヤワラビ科										
<i>Pentarhizidium orientale</i>	イヌガンソク	2597	A	*						
Dryopteridaceae オシダ科										
<i>Dryopteris crassirhizoma</i>	オシダ	2487	A	*		*	*			
<i>D. expansa</i>	シラネワラビ	2539, 3002	A	*		*	*			
<i>Leptorumohra miqueliana</i>	ホソバナライシダ	2715, 2829, 2843	AL		*	*				
GYMNOSPERMAE 裸子植物										
Pinaceae マツ科										
<i>Abies homolepis</i>	ウラジロモミ	固 2598, 3009	A	*		*	*			
<i>Larix kaempferi</i>	カラマツ	固 2540, 2760, 17701	AOF	*		*	*	*	*	*
<i>Pinus densiflora</i>	アカマツ	2513	AO	*		*	*	*	*	
<i>P. parviflora</i> var. <i>parviflora</i>	ヒメコマツ	2706, 2708	AO		*	*	*	*	*	
<i>Tsuga diversifolia</i>	コマツガ	固 2566, 2710	A	*	*					
ANGIOSPERMAE 被子植物										
Schisandraceae マツブサ科										
<i>Schisandra chinensis</i>	チョウセンゴミシ	2482, 3105	A	*		*			*	
Saururaceae ドクダミ科										
<i>Houttuynia cordata</i>	ドクダミ	2952	A			*				
Magnoliaceae モクレン科										
<i>Magnolia obovata</i>	ホオノキ	固 2562	A	*		*				
(MONOCOTYLEDONS 単子葉類)										
Nartheciaceae キンコウカ科										
<i>Aletris foliata</i>	ネバリノギラン	固 3068	O						*	
<i>A. luteoviridis</i>	ノギラン	固 3004, 3067	AO				*	*	*	
Dioscoreaceae ヤマノイモ科										
<i>Dioscorea nipponica</i>	ウチワドコロ	2953	A			*				
Colchicaceae イヌサフラン科										
<i>Disporum smilacinum</i>	チゴユリ	2853	L			*				
Liliaceae ユリ科										
<i>Clintonia udensis</i>	ツバメオモト	3024	L					*		
<i>Lilium leichtlinii</i> f. <i>pseudotigrinum</i>	コオニユリ	2941	A			*				
Orchidaceae ラン科										
<i>Cephalanthera longibracteata</i>	ササバギンラン	2590	A	*						
<i>Chondradenia fauriei</i>	オノエラン	固 2763	A			*				
<i>Gastrodia elata</i>	オニノヤガラ	2837	L			*				
<i>Goodyera schlechtendaliana</i>	ミヤマウズラ	VU 3008	A					*		
<i>Liparis krameri</i> var. <i>krameri</i>	ジガバナソウ	EN 2582, 2780	A	*		*	*	*		
<i>L. kumokiri</i>	クモキリソウ	2777	A			*				
<i>Malaxis monophyllos</i>	ホザキイチウラン	CR 2841	L			*				
<i>Neottia cordata</i>	コフタバラン	3003	A					*		
<i>N. nipponica</i>	ミヤマフタバラン	16511	R	*	*					
<i>Neottianthe cucullata</i>	ミヤマモジズリ	VU 3005	A					*		
<i>Platanthera tipuloides</i> subsp. <i>tipuloides</i> var. <i>sororia</i>	ホソバナキソチドリ	2792	A			*				
<i>Spiranthes sinensis</i> var. <i>amoena</i>	ネジバナ	2946	A			*				
<i>Tipularia japonica</i> var. <i>japonica</i>	ヒトツボクロ	CR 2808	L			*				
Iridaceae アヤメ科										
<i>Iris sanguinea</i> var. <i>sanguinea</i>	アヤメ	2497	A	*						
Asparagaceae キジカクシ科										
<i>Convallaria majalis</i> var. <i>manshurica</i>	スズラン	2805	L			*				
<i>Maianthemum dilatatum</i>	マイヅルソウ	2476	A	*		*	*			
<i>Polygonatum humile</i>	ヒメイズイ	CR 3069	O						*	
<i>P. odoratum</i> var. <i>pluriflorum</i>	アマドコロ	3063	O						*	
Juncaceae イグサ科										
<i>Juncus tenuis</i>	クサイ	外 2739, 2784	A			*	*			
<i>Luzula capitata</i>	スズメノヤリ	2503	A	*						
<i>L. jimboi</i> subsp. <i>jimboi</i>	ジンボソウ	2577	A	*						
Cyperaceae カヤツリグサ科										
<i>Bulbostylis densa</i> var. <i>densa</i>	イトハナビテンツキ	NT 3066, AsNf23090507	O						*	
<i>Carex aphanolepis</i>	エナシヒゴクサ	2778, 2842, 3117	AL			*	*		*	
<i>C. incisa</i>	カワラスゲ	固 2831	L			*				
<i>C. japonica</i>	ヒゴクサ	2585	A	*						

学名	和名	備考	採集地・採集・確認日(2023)													
			採略号	6		7		8		9		10				
				2	8	12	18	2	7	17	1	17	30	5	16	6
<i>C. leucochlora</i> var. <i>morrisonicola</i>	ニイタカスゲ	2593	A	*												
<i>C. oxyandra</i> var. <i>oxyandra</i>	ヒメスゲ	2502, 2526, 2712	AO	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
<i>C. sachalinensis</i> var. <i>iwakiana</i>	コイトスゲ	固 2527, 2529, 2583, 2594	A	*												
Poaceae イネ科																
<i>Agrostis clavata</i> var. <i>clavata</i>	ヤマヌカボ	3006	A							*						
<i>Anthoxanthum odoratum</i> subsp. <i>odoratum</i>	ハルガヤ	外 2480	A	*												
<i>Arundinella hirta</i> var. <i>ciliata</i>	ウスゲトダシバ	AsNf23090503	O											*		
<i>A. hirta</i> var. <i>glauca</i>	シロトダシバ	固 17706	F												*	
<i>A. hirta</i> var. <i>hirta</i>	ゲトダシバ	2751	A					*								
<i>Avenella flexuosa</i>	コメススキ	2548, 2757, 3058	AO	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
<i>Brachypodium sylvaticum</i> var. <i>miserum</i>	ヤマカモジグサ	3018	AL					*			*	*	*	*	*	*
<i>Calamagrostis brachytricha</i> var. <i>brachytricha</i>	ノガリヤス	3114	A												*	
<i>C. hakonenensis</i>	ヒメノガリヤス	2969, 3017, 3049, AsNf23090508	ALO						*	*	*	*	*	*	*	*
<i>C. sachalinensis</i>	タカネノガリヤス	3061, AsNf23090501	O											*	*	*
<i>Digitaria violascens</i> var. <i>violascens</i>	アキメヒシバ	3065, AsNf23090506	O											*	*	*
<i>Festuca ovina</i> subsp. <i>ovina</i> var. <i>ovina</i>	シンウシノケグサ	2740, AsNf23090502	AO					*						*	*	*
<i>F. rubra</i> var. <i>rubra</i>	オオウシノケグサ	2595, 2741, 2748, 2749	A	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
<i>Melica nutans</i> subsp. <i>nutans</i>	コメガヤ	2964	A						*							
<i>Microstegium vimineum</i>	アシボソ	3027	L							*						
<i>Miscanthus sinensis</i>	ススキ	2942	A					*	*	*	*	*	*	*	*	*
<i>Oplismenus undulatifolius</i> var. <i>japonicus</i>	コチヂミザサ	3035	L								*	*	*	*	*	*
<i>O. undulatifolius</i> var. <i>undulatifolius</i>	ケチヂミザサ	3119	A	*										*	*	*
<i>Phalaris arundinacea</i> var. <i>arundinacea</i>	クサヨシ	2750	A					*								
<i>Poa pratensis</i> subsp. <i>irrigua</i>	ミスジナガハグサ	外 2576	A	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
<i>Sasa senanensis</i> var. <i>senanensis</i>	クマイザサ	2499	A	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
[EUDICOTILEDONEAE 真正双子葉類]																
Ranunculaceae キンボウゲ科																
<i>Aquilegia buergeriana</i> var. <i>buergeriana</i> f. <i>flavescens</i>	キバナノヤマオダマキ	固 2783	A					*								
<i>Cimicifuga simplex</i> var. <i>simplex</i>	サラシナショウマ	2847	L						*							
<i>Clematis apiifolia</i> var. <i>apiifolia</i>	ボタンヅル	2963	A							*						
<i>Ranunculus japonicus</i> var. <i>japoicus</i>	ウマノアシガタ	2510	A	*												
<i>R. nipponicus</i> var. <i>submersus</i>	バイカモ	固 3214, AsNf23090514	K					*				*	*	*	*	*
<i>Thalictrum rochebruneum</i>	シキンカラマツ	2828	L						*							
Saxifragaceae ユキノシタ科																
<i>Astilbe microphylla</i> var. <i>microphylla</i>	チダケサシ	固 2951	A							*						
<i>A. thunbergii</i> var. <i>thunbergii</i>	アカショウマ	固 2766	A					*								
Vitaceae ブドウ科																
<i>Vitis coignetiae</i>	ヤマブドウ	2533	A	*						*						
Fabaceae マメ科																
<i>Amorpha fruticosa</i>	イタチハギ	外 2804, 3206	AH					*								*
<i>Amphicarpaea bracteata</i> subsp. <i>edgeworthii</i>	ヤブマメ	3040	L								*					
<i>Lespedeza bicolor</i> var. <i>bicolor</i>	ヤマハギ	2939	A							*						
<i>Maackia amurensis</i>	イヌエンジュ	2599	A	*												
<i>Pueraria lobata</i> subsp. <i>lobata</i>	クズ	2937	A							*						
<i>Trifolium pratense</i>	ムラサキツメクサ	外 2498	A	*												
<i>T. repens</i>	シロツメクサ	外 2477	A	*						*						
<i>Wisteria floribunda</i>	フジ	固 2938	A							*						
Rosaceaeバラ科																
<i>Agrimonia nipponica</i>	ヒメキンミズヒキ	3020, 3112	LA								*	*	*	*	*	*
<i>A. pilosa</i> var. <i>japonica</i>	キンミズヒキ	2962	A							*						
<i>Aria alnifolia</i>	アズキナシ	2575	A	*												
<i>Aruncus dioicus</i> var. <i>kamtschaticus</i>	ヤマブキショウマ	2747	A					*								
<i>Cerasus nipponica</i> var. <i>nipponica</i>	タカネザクラ	固 2520, 2528	A	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
<i>Geum aleppicum</i>	オオダイコンソウ	2803	A					*	*	*	*	*	*	*	*	*
<i>Malus toringo</i> var. <i>toringo</i>	ズミ	2524, 2775	AO	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
<i>Padus grayana</i>	ウワミズザクラ	固 2789, 2799	A					*	*	*	*	*	*	*	*	*
<i>Potentilla centigrana</i>	ヒメヘビイチゴ	2770	A					*								
<i>P. cryptotaeniae</i>	ミツモトソウ	2972	A						*							
<i>P. freyniana</i>	ミツバツチグリ	2485, 2584	A	*												
<i>Rosa amblyotis</i>	カラフトイバラ	EN 3070, AsNf23090509	O											*	*	*
<i>R. multiflora</i> var. <i>multiflora</i>	ノイバラ	2554, 2737	A	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
<i>R. multiflora</i> var. <i>multiflora</i> f. <i>inermis</i>	トゲナシノイバラ	AsNf23090510	O											*	*	*
<i>Rubus microphyllus</i>	ニガイチゴ	2475	A	*												
<i>R. parvifolius</i>	ナワシロイチゴ	2494	A	*												
<i>R. subcrataegifolius</i>	ミヤマニガイチゴ	2561	A	*												
<i>Sanguisorba officinalis</i>	ワレモコウ	3062	O											*	*	*
<i>Sorbus commixta</i> var. <i>rufoferruginea</i>	サビバナナカマド	固 2508, 2521	A	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
<i>Spiraea japonica</i> var. <i>japonica</i>	シモツケ	2516, 2701, 2734	A	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Rhamnaceae クロウメモドキ科																
<i>Berchemia racemosa</i> var. <i>racemosa</i>	クマヤナギ	固 2849	L						*							
Ulmaceae ニレ科																
<i>Ulmus davidiana</i> var. <i>japonica</i>	ハルニレ	2772	A					*								
Fagaceae ブナ科																
<i>Castanea crenata</i>	クリ	3037	L									*				
<i>Fagus crenata</i>	ブナ	固 3064	O										*			
<i>Quercus crispula</i> var. <i>crispula</i>	ミズナラ	2695, 17709	AF		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
<i>Q. × crispuloserrata</i>	ミズコナラ	2489 ミズナラ×コナラ	A	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
<i>Q. serrata</i> subsp. <i>serrata</i> var. <i>serrata</i>	コナラ	2495, 17710	AF	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Betulaceae カバノキ科																
<i>Alnus firma</i> f. <i>hirtella</i>	ミヤマヤシャブシ	固 2501, 2549, 2711, 3053, 17707	AOF	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
<i>A. hirsuta</i> var. <i>sibirica</i>	ヤマハンノキ	2769	A					*								

学名	和名	備考	採集地・採集・確認日(2023)					
			採略号	6	7	8	9	10
				2 8 12 18	2 7 17	1 17 30	5 16 6	
<i>Betula ermanii</i> var. <i>ermanii</i>	ダケカンバ	2493, 2519, 2785	A	*	*	*		
<i>B. platyphylla</i> var. <i>japonica</i>	シラカンバ	2518, 2794	AO	*	*	*	*	
<i>Carpinus japonica</i> var. <i>japonica</i>	クマシデ	固 2788	A		*			
<i>Corylus sieboldiana</i> var. <i>sieboldiana</i>	ツノハシバミ	2797, 3025, AsNf23090505	AL		*	*	*	
Celastraceae ニシキギ科								
<i>Celastrus orbiculatus</i> var. <i>orbiculatus</i>	ツルウメモドキ	2755	A		*			
<i>C. orbiculatus</i> var. <i>strigillosus</i>	オニツルウメモドキ	2698, 3001	A		*	*	*	
<i>Euonymus alatus</i> var. <i>alatus</i> f. <i>alatus</i>	ニシキギ	3032	L			*	*	
<i>E. oxyphyllus</i> var. <i>oxyphyllus</i>	ツリバナ	2574, 3204	AH	*		*	*	*
<i>E. hamiltonianus</i> subsp. <i>sieboldianus</i> var. <i>sanguineus</i>	カントウマユミ	3210	AH		*			*
Oxalidaceae カタバミ科								
<i>Oxalis corniculata</i> var. <i>villosa</i>	カタバミ	2771	A		*			
<i>O. stricta</i>	エゾタチカタバミ	16514	R		*			
Euphorbiaceae トウダイグサ科								
<i>Euphorbia maculata</i>	コニシキソウ	外 2955	A			*		
Salicaceae ヤナギ科								
<i>Populus tremula</i> var. <i>sieboldii</i>	ヤマナラシ	2488, 2552	A	*				
<i>Salix caprea</i>	バッコヤナギ	2703	A		*			
<i>S. integra</i>	イヌコリヤナギ	2491	A	*				
<i>S. reinii</i>	ミヤマヤナギ	2500, 2530, 2547	A	*	*			
<i>S. udensis</i>	オノエヤナギ	2774	A		*			
Violaceae スミレ科								
<i>Viola grypoceras</i> var. <i>grypoceras</i>	タチツボスミレ	2532	A	*				
<i>V. mandshurica</i> var. <i>mandshurica</i>	スミレ	2957	A			*		
<i>V. sieboldii</i>	フモトスミレ	16496	F	*				
<i>V. tokubuchiana</i> var. <i>takedana</i>	ヒナスミレ	2852	L			*		
Hypericaceae オトギリソウ科								
<i>Hypericum gracillimum</i>	オクヤマオトギリ	固 2790, 2851, 2945	AL		*	*	*	
<i>H. laxum</i>	コケオトギリ	3078	S					*
Geraniaceae フウロソウ科								
<i>Geranium sanguineum</i>	アケボノフウロ	外 2752 逸出	A		*			
<i>G. thunbergii</i>	ゲンノショウコ	2956, 2998, 3034	AL			*	*	*
Onagraceae アカバナ科								
<i>Circaea erubescens</i>	タニタデ	3030	L				*	
<i>Epilobium amurense</i> subsp. <i>amurense</i>	ケゴンアカバナ	2965, 3073, AsNf23090512	AO			*	*	*
<i>Oenothera biennis</i>	メマツヨイグサ	外 2934	A			*		
<i>O. perennis</i> var. <i>perennis</i>	ヒナマツヨウグサ	外 3076, AsNf23090513	O				*	
Anacardiaceae ウルシ科								
<i>Toxicodendron orientale</i> subsp. <i>orientale</i>	ツタウルシ	2557	A	*	*			
<i>T. trichocarpum</i>	ヤマウルシ	2525	A	*	*	*		
Sapindaceae ムクロジ科								
<i>Acer australe</i>	ナンゴクミネカエデ	固 2559, 3000	A	*		*		
<i>A. crataegifolium</i>	ウリカエデ	固 3007, 3211, 3212	AH			*		*
<i>A. micranthum</i>	コミネカエデ	固	A			*		*
<i>A. pictum</i> subsp. <i>dissectum</i> f. <i>connivens</i>	ウラゲエンコウカエデ	2835, 3209	LH			*		*
<i>A. pictum</i> subsp. <i>dissectum</i> f. <i>dissectum</i>	エンコウカエデ	3207, 3208	H					*
<i>A. rufinerve</i>	ウリハダカエデ	固 2563	A	*	*	*	*	
<i>A. tschonoskii</i>	ミネカエデ	固 2486, 2765	A	*	*	*		
<i>A. ukurunduense</i>	オガラバナ	2555, 2699	A	*	*	*		
<i>Aesculus turbinata</i>	トチノキ	固 3023	L				*	
Brassicaceae アブラナ科								
<i>Arabidopsis kamchatatica</i> subsp. <i>kamchatatica</i>	ミヤマハタザオ	EN 2967	A			*		
<i>Arabis hirsuta</i>	ヤマハタザオ	2745	A			*		
<i>Cardamine scutata</i> var. <i>scutata</i>	タネツケバナ	2586	A	*				
Santalaceae ビャクダン科								
<i>Viscum album</i> subsp. <i>coloratum</i> f. <i>lutescens</i>	ヤドリギ	2754	A			*		
Polygonaceae タデ科								
<i>Aconogonon weyrichii</i> var. <i>alpinum</i>	オンタデ	2762	A			*		
<i>Fallopia japonica</i> var. <i>japonica</i>	イタドリ	2504, 2759	AO	*	*	*	*	*
<i>Persicaria filiformis</i>	ミズヒキ	3028, 17708	LF				*	*
<i>P. lapathifolia</i> var. <i>incana</i>	サナエタデ	3110	A				*	*
<i>P. longiseta</i>	イヌタデ	3075, 3109	OA				*	*
<i>P. nepalensis</i>	タニソバ	3071	O				*	*
<i>P. posumbu</i> var. <i>posumbu</i>	ハナタデ	17713	F				*	*
<i>P. posumbu</i> var. <i>stenophylla</i>	ホソバハナタデ	3021	L				*	*
<i>P. thunbergii</i> var. <i>hastata</i>	ヤマミゾソバ	17700	F					*
<i>Rumex acetosella</i> subsp. <i>pyrenaicus</i>	ヒメスイバ	外 2570	A	*				
Caryophyllaceae ナデシコ科								
<i>Arenaria lateriflora</i>	オオヤマフスマ	2565, 2844	AL	*		*		
<i>A. serpyllifolia</i> var. <i>serpyllifolia</i>	ノミノツヅリ	2479	A	*				
<i>Cerastium fontanum</i> subsp. <i>vulgare</i> var. <i>angustifolium</i>	ミミナグサ	2490, 2700	A	*	*			
<i>Pseudostellaria palibiniana</i>	ヒゲネワチガイソウ	2833	L			*		
<i>Sagina japonica</i>	ツメクサ	2742	A			*		
<i>Silene baccifera</i> var. <i>japonica</i>	ナンバンハコベ	3013	L				*	
Cornaceae ミズキ科								
<i>Cornus canadensis</i>	ゴゼンタチバナ	2579	A	*		*		
<i>C. controversa</i> var. <i>controversa</i>	ミズキ	2567, 3041	AL	*		*	*	
Hydrangeaceae アジサイ科								
<i>Deutzia crenata</i>	ウツギ	2744	A			*		
<i>Hydrangea paniculata</i>	ノリウツギ	2733	AO			*	*	*

学名	和名	備考	採集地・採集・確認日(2023)																	
			採略号	6		7		8		9		10								
				2	8	12	18	2	7	17	1	17	30	5	16	6				
Balsaminaceae ツリフネソウ科																				
<i>Impatiens noli-tangere</i>	キツリフネ	3031	L																	*
Primulaceae サクラソウ科																				
<i>Lysimachia clethroides</i>	オカトラノオ	2936	A																	*
<i>L. europaea</i>	ツマトリソウ	2536, 2580	A	*				*												*
<i>L. japonica</i> var. <i>japonica</i>	コナスビ	2782	A					*												*
<i>L. vulgaris</i> subsp. <i>davurica</i>	クサレダマ	2948	A																	*
Symplocaceae ハイノキ科																				
<i>Symplocos sawafutagi</i> var. <i>sawafutagi</i>	サワフタギ	2568	A	*				*												*
Diapensiaceae イワウメ科																				
<i>Schizocodon soldanelloides</i> var. <i>soldanelloides</i>	イワカガミ	固 2531	AO	*				*												*
Actinidiaceae マタタビ科																				
<i>Actinidia arguta</i> var. <i>arguta</i>	サルナシ	2786	A					*												
Clethraceae リョウブ科																				
<i>Clethra barbinervis</i>	リョウブ	2537	AO	*				*												*
Ericaceae ツツジ科																				
<i>Arcterica nana</i>	コメバツガザクラ	2544, 2707	AO	*	*			*												*
<i>Cassiope lycopodioides</i>	イワヒゲ	2761	AO					*	*											*
<i>Chimaphila japonica</i>	ウメガサソウ	2718, 2781, 16517	AR	*	*	*		*												*
<i>Elliottia bracteata</i>	ミヤマホツツジ	固 2767	A					*												*
<i>E. paniculata</i>	ホツツジ	固 2800, 2966, 3048	AO					*					*	*	*					*
<i>Empetrum nigrum</i> var. <i>japonicum</i>	ガンコウラン	2512, 2764, 17704	AOF	*				*	*	*			*	*	*					*
<i>Eubotryoides grayana</i> var. <i>grayana</i>	ハナヒリノキ	2507	A	*				*					*	*	*					*
<i>E. grayana</i> var. <i>parvifolia</i>	ヒメハナヒリノキ	固 16493	O	*																*
<i>E. grayana</i> var. <i>pruinosa</i>	ウスユキハナヒリノキ	固 2511, 3059	AO	*																*
<i>Gaultheria pyrololides</i>	シラタマノキ	2796, 3047	AO					*					*	*	*					*
<i>Hypopitys monotropa</i>	ジャクジョウソウ	2758, 2806, 2836, 3011	AL					*	*	*			*	*	*					*
<i>Loiseleuria procumbens</i>	ミネズオウ	2709, 2793	AO					*	*	*			*	*	*					*
<i>Lyonia ovalifolia</i> var. <i>elliptica</i>	ネジキ	3050, AsNf23090504	O																	*
<i>Monotropastrum humile</i>	ギンリョウソウ	2587	A	*																*
<i>Phyllodoce nipponica</i> subsp. <i>nipponica</i>	ツガザクラ	固 2542, 2543	AO	*				*					*	*	*					*
<i>Pyrola alpina</i>	コバノイチヤクソウ	固 2756, 16513	AR					*	*	*			*	*	*					*
<i>P. asarifolia</i> subsp. <i>incarnata</i>	ベニバナイチヤクソウ	2592, 16507	AF	*	*			*	*	*			*	*	*					*
<i>P. japonica</i>	イチヤクソウ	2768, 2787, 2807, 16508 ~16510	ALFR	*	*			*	*	*			*	*	*					*
<i>P. japonica</i> f. <i>subaphylla</i>	ヒトツバイイチヤクソウ	2713, 2838, 16512, 16515, 16516	ALR	*	*			*	*	*			*	*	*					*
<i>P. nephrophylla</i>	マルバノイチヤクソウ	固 2776, 2850, 16498	ALF	*				*	*	*			*	*	*					*
<i>P. renifolia</i>	ジンヨウイチヤクソウ	2589, 2779, 16497	FA	*	*			*	*	*			*	*	*					*
<i>Rhododendron brachycarpum</i> var. <i>brachycarpum</i>	ハクサンジャクナゲ	固 2509, 2546	AO	*				*	*	*			*	*	*					*
<i>R. degronianum</i> var. <i>degronianum</i>	アズマジャクナゲ	固 2705	A					*												*
<i>R. kaempferi</i> var. <i>kaempferi</i>	ヤマツツジ	固	A																	*
<i>R. keiskei</i> var. <i>keiskei</i>	ヒカゲツツジ	固 3051	O																	*
<i>R. molle</i> subsp. <i>japonicum</i>	レンゲツツジ	固 2474	A	*				*					*	*	*					*
<i>R. multiflorum</i> var. <i>multiflorum</i>	ウラジロヨウラク	固 2522, 3052	AO	*				*	*	*			*	*	*					*
<i>R. pentandrum</i>	コヨウラクツツジ	2535	A	*				*	*	*			*	*	*					*
<i>R. tschonoskii</i> subsp. <i>tschonoskii</i> var. <i>tetramerum</i>	チョウジコメツツジ	固 2545, 3057, 16494	OA	*	*			*	*	*			*	*	*					*
<i>R. tschonoskii</i> subsp. <i>tschonoskii</i> var. <i>tschonoskii</i>	コメツツジ	2798	OA	*				*	*	*			*	*	*					*
<i>R. wadanum</i>	トウゴクミツバツツジ	固 2550	AO	*				*	*	*			*	*	*					*
<i>Vaccinium hirtum</i> var. <i>pubescens</i>	ウスノキ	固 2517, 3055	AO	*				*	*	*			*	*	*					*
<i>V. uliginosum</i> var. <i>japonica</i>	クロマメノキ	2541, 17703	AOF	*				*	*	*			*	*	*					*
<i>V. vitis-idaea</i>	コケモモ	2515, 17705	AOF	*				*	*	*			*	*	*					*
Rubiaceae アカネ科																				
<i>Galium pseudoasprellum</i> var. <i>pseudoasprellum</i>	オオバノヤエムグラ	3079	L																	*
<i>G. trifidum</i> subsp. <i>columbianum</i>	ホソバノヨツバムグラ	2832, 3022	L																	*
<i>G. trifloriforme</i>	オククルマムグラ	2581, 3019	AL	*																*
<i>G. verum</i> subsp. <i>asiaticum</i> var. <i>trachycarpum</i>	エゾノカワラマツバ	2960	A																	*
Gentianaceae リンドウ科																				
<i>Gentiana makinoi</i>	オヤマリンドウ	固 3111	A																	*
<i>Halenia corniculata</i>	ハナイカリ	3015, 3118	LA																	*
<i>Tripterospermum japonicum</i> var. <i>japonicum</i>	ツルリンドウ	2560, 3116	A	*				*												*
Apocynaceae キョウチクトウ科																				
<i>Cynanchum caudatum</i> var. <i>caudatum</i>	イケマ	2947, 3039	AL																	*
Convolvulaceae ヒルガオ科																				
<i>Calystegia pubescens</i> f. <i>major</i>	ヒルガオ	2935	A																	*
Oleaceae モクセイ科																				
<i>Ligustrum obtusifolium</i> subsp. <i>obtusifolium</i>	イボタノキ	2791	A																	*
<i>L. tschonoskii</i> var. <i>tschonoskii</i>	ミヤマイボタ	2492, 2735	A	*				*												*
Plantaginaceae オオバコ科																				
<i>Veronica arvensis</i>	タチイヌノフグリ	外 2478	A	*																*
<i>V. onoei</i>	ゲンバイヅル	固 VU(VU)2696	AO					*												*
Scrophulariaceae ゴマノハグサ科																				
<i>Buddleja japonica</i>	フジウツギ	固 2943	A																	*
<i>Verbascum thapsus</i>	ピロードモウズイカ	外 2940	A																	*
Lamiaceae シソ科																				
<i>Clinopodium micranthum</i> var. <i>micranthum</i>	イヌトウバナ	2834	L																	*
<i>Elisholtzia ciliata</i>	ナギナクコウジュ	3205, 17714	HF																	*
<i>Lycopus uniflorus</i>	エゾシロネ	3014	L																	*
<i>Prunella vulgaris</i> subsp. <i>asiatica</i> var. <i>lilacina</i> f. <i>asiatica</i>	ウツボグサ	2736	A					*												*
<i>Scutellaria laeteviolacea</i> var. <i>abbreviata</i>	トウゴクシソバツツナミ	固 3042	L																	*
<i>Stachys aspera</i> var. <i>hispidula</i>	イヌゴマ	AsNf23090511	O																	*
<i>Thymus quinquecostatus</i> var. <i>ibukiensis</i>	イブキジャコウソウ	2704	A					*												*

学名	和名	備考	採集地・採集・確認日(2023)																	
			採略号	6		7		8		9		10								
				2	8	12	18	2	7	17	1	17	30	5	16	6				
Orobanchaceae ハマウツボ科																				
<i>Euphrasia maximowiczii</i> var. <i>maximowiczii</i>	タチコゴメグサ	2961	A							*										
Aquifoliaceae モチノキ科																				
<i>Ilex macropoda</i>	アオハダ	2719	A		*		*		*											
Campanulaceae キキョウ科																				
<i>Campanula punctata</i> var. <i>hondoensis</i>	ヤマホタルブクロ	固 2732	AO				*												*	
<i>Peracarpa carnos</i> var. <i>carnos</i>	タニギキョウ	2717, 2845	AL		*		*		*											
Asteraceae キク科																				
<i>Achillea millefolium</i>	セイヨウノコギリソウ	外 2753, 2999	A				*		*											
<i>Anaphalis margaritacea</i> subsp. <i>margaritacea</i> var. <i>margaritacea</i>	ヤマハハコ	2944, 17716	AF						*											*
<i>Artemisia indica</i> var. <i>maximowiczii</i>	ヨモギ	3077, 3107, 3108	SA																*	*
<i>A. montana</i> var. <i>montana</i>	オオヨモギ	3038	L																*	
<i>Aster microcephalus</i> var. <i>ovatus</i>	ノコンギク	固 3036, 3106, 17715	LAF																*	*
<i>Carpesium triste</i>	ミヤマヤブタバコ	固 2830, 3033	L						*										*	
<i>Cirsium comosum</i> var. <i>incomptum</i>	トネアザミ(タイアザミ)	固 3104	A																*	
<i>C. oligophyllum</i> var. <i>oligophyllum</i>	ノハラアザミ	固 3120	A																*	
<i>Conyza canadensis</i>	ヒメムカシヨモギ	外 3054	O																*	
<i>Crepidiastrum denticulatum</i>	ヤクシソウ	3072	O																*	
<i>Erigeron philadelphicus</i>	ハルジオン	外 2571	A		*															
<i>E. strigosus</i>	ヘラバヒメジョオン	外 2738, 2959	A						*											
<i>Eupatorium glehnii</i>	ヨツバヒヨドリ	2802, 2971	A							*										
<i>Inula salicina</i> var. <i>asiatica</i>	カセンソウ	2950	A																	
<i>Ixeridium dentatum</i> subsp. <i>dentatum</i>	ニガナ	2514, 2746	A		*		*													
<i>Leucanthemum vulgare</i>	フランスギク	外 2481	A		*															
<i>Ligularia dentata</i>	マルバダケブキ	2848	L							*										
<i>Parasenecio farfarifolius</i> var. <i>farfarifolius</i>	ウスゲタマブキ	固 2846	L							*										
<i>Picris hieracioides</i> subsp. <i>japonica</i> var. <i>japonica</i>	コウゾリナ	2933	A							*										
<i>Pterocypsela elata</i>	ヤマニガナ	3026	L																*	
<i>Senecio cannabifolius</i>	ハンゴンソウ	2773, 3113	A						*										*	
<i>S. nemorensis</i>	キオン	3029	L																*	
<i>Solidago gigantea</i> subsp. <i>serotina</i>	オオアワダチソウ	外 2949	A							*									*	
<i>S. virgaurea</i> subsp. <i>asiatica</i> var. <i>asiatica</i>	アキノキリンソウ	3010	LO																*	*
<i>S. virgaurea</i> subsp. <i>leiocarpa</i> var. <i>leiocarpa</i> f. <i>japonalpestris</i>	ミヤマアキノキリンソウ	2968	A							*	*								*	
<i>Taraxacum officinale</i>	セイヨウタンポポ	外 2553	A		*															
<i>Youngia japonica</i> subsp. <i>elstonii</i>	アカオニタピラコ	2496	A		*															
Adoxaceae レンブクソウ科																				
<i>Sambucus racemosa</i> subsp. <i>sieboldiana</i> var. <i>sieboldiana</i> f. <i>stenophylla</i>	ケニワトコ	2702	A				*													
<i>Viburnum furcatum</i>	オオカメノキ	2523	A		*			*		*										
<i>V. wrightii</i> var. <i>wrightii</i>	ミヤマガマズミ		A					*												
Caprifoliaceae スイカズラ科																				
<i>Patrinia triloba</i> var. <i>triloba</i>	ハクサンオミナエシ	固 2954	A																*	
<i>Scabiosa japonica</i> var. <i>japonica</i>	マツムシソウ	固	O																*	
<i>Weigela decora</i> var. <i>decora</i>	ニシキウツギ	固 2506	A		*															
Araliaceae ウコギ科																				
<i>Aralia cordata</i> var. <i>cordata</i>	ウド	2564	A		*															
<i>A. elata</i>	タラノキ	2505	A		*														*	
<i>Chengiopanax sciadophylloides</i>	コシアブラ	固 2558, 2697, 2716, 3115	A		*	*		*	*	*									*	
<i>Kalopanax septemlobus</i> var. <i>septemlobus</i>	ハリギリ	2578	A		*															
<i>Oplopanax japonicus</i> var. <i>japonicus</i>	ハリブキ	固	A																*	
Apiaceae セリ科																				
<i>Chamaele decumbens</i> var. <i>decumbens</i>	セントウソウ	固	A							*	*								*	
<i>Ostericum florentii</i>	ミヤマニンジン	2801, 3012, 3016, 17717	ALF							*	*	*	*						*	
<i>Torilis japonica</i>	ヤブジラミ	2958	A							*	*	*	*						*	

引用文献

群馬県 (2022) 群馬県の絶滅のおそれのある野生生物 (群馬県レッドデータブック) 植物編2022年改訂版. 295pp. 群馬県環境森林部自然環境課.

加藤雅啓・海老原淳 (2011) 日本の固有植物 (国立科学博物館叢書11). 503pp. 東海大出版会.

大平 満・大森威宏・片野光一・鈴木伸一・蛭間 啓・吉井広始 (2023) 籠ノ登山 (東西), 水ノ塔山及び浅間外輪山の植物 [2年目]. 良好な自然環境を有する地域学術調査報告書, 49: 3-20. 群馬県林務部自然環境課.

米倉浩司 (2012) 日本維管束植物目録. 379pp. 北隆館.

(大平 満・大森 威宏・吉井 広始)

イ 浅間山北麓地域のコケ植物目録

- 1 調査者：中澤和則 Nakazawa, Kazunori
- 2 調査日及び調査場所
4月21日・7月7日：長野原町菅浅間園、9月5日：鬼押出し園
- 3 このリストは1種を除き証拠標本に基づいて作成された。
- 4 学名は、マゴケ植物門（蘚類、Bryophyta）をSuzuki (2016) に、ゼニゴケ植物門（タイ類、Marchantiophyta）を片桐・古木 (2018) に従ったが、マゴケ植物門のシモフリゴケ類の新属和名、*Bucklandiella* (クロカワキゴケ属) と *Niphotrichum* (エゾスナゴケ属) については出口ほか (2020) に依った。なお、それぞれアルファベット順に配列した。
- 5 備考欄の数字は中澤の標本番号である。
- 6 本目録には、マゴケ植物門が34属40種、ゼニゴケ植物門が12属13種の計46属53種が記録されている。

学名	和名	標本番号
BRYOPHYTA マゴケ植物門(蘚類)		
<i>Anomobryum</i> ギンゴケモドキ属		
<i>Anomobryum filiforme</i>	ヒメギンゴケモドキ	2019632
<i>Bartramiopsis</i> フウリンゴケ属		
<i>Bartramiopsis lescurii</i>	フウリンゴケ	2020020
<i>Brachymenium</i> ウリゴケ属		
<i>Brachymenium exile</i>	ホソウリゴケ	2019635
<i>Brachythecium</i> アオギヌゴケ属		
<i>Brachythecium campestre</i>	ノコギリアオギヌゴケ	2019630
<i>Bryhnia</i> ヤノネゴケ属		
<i>Bryhnia novae-angliae</i>	ヤノネゴケ	2020017
<i>Bucklandiella</i> クロカワキゴケ属		
<i>Bucklandiella laeta</i>	トカチスナゴケ	2020023
<i>Callicladium</i> クサゴケ属		
<i>Callicladium haldanianum</i>	クサゴケ	2019655
<i>Ceratodon</i> ヤノウエノアカゴケ属		
<i>Ceratodon purpureus</i>	ヤノウエノアカゴケ	2019637
<i>Ctenidium</i> クシノハゴケ属		
<i>Ctenidium capillifolium</i>	クシノハゴケ	2019646
<i>Dicranella</i> ススキゴケ属		
<i>Dicranella dilatatinervis</i>	ミチノクオバナゴケ	2019650
<i>D. subsecunda</i>	ミヤマススキゴケ	2020014
<i>Dicranum</i> シッポゴケ属		
<i>Dicranum japonicum</i>	シッポゴケ	2020010
<i>D. majus</i>	チシマシッポゴケ	2019651 2020003 2020004
<i>Didymodon</i> フタゴゴケ属		
<i>Didymodon ferrugineus</i>	ジムカデゴケ	2019567
<i>Gollania</i> ラッコゴケ属		
<i>Gollania ruginosa</i>	シワラッコゴケ	2019640 2019661 2019803
<i>Grimmia</i> ギボウシゴケ属		
<i>Grimmia pilifera</i>	ケギボウシゴケ	2020024 2020025
<i>Herzogiella</i> ツヤイチイゴケ属		
<i>Herzogiella perrobusta</i>	ミチノクイチイゴケ	2020002 2020012
<i>Hyophila</i> ハマキゴケ属		
<i>Hyophila propagulifera</i>	ハマキゴケ	2019628 2019634
<i>Hypnum</i> ハイゴケ属		
<i>Hypnum fujiyamae</i>	フジハイゴケ	2020026
<i>H. pallescens</i>	キノウエノコハイゴケ	2019641
<i>H. subimponens</i> subsp. <i>ulophyllum</i>	ヤマハイゴケ	2019801
<i>Leptodontium</i> オウゴンゴケ属		
<i>Leptodontium flexifolium</i>	トサノオウゴンゴケ	2019633
<i>Niphotrichum</i> エゾスナゴケ属		
<i>Niphotrichum barbulooides</i>	コバノスナゴケ	2019808 2020029
<i>Oncophorus</i> コブゴケ属		
<i>Oncophorus crispifolius</i>	チヂミバコブゴケ	2020005
<i>Palamocladium</i> アツサゴケモドキ属		
<i>Palamocladium leskeoides</i>	アツサゴケモドキ	2019642 2019643 2019644
<i>Plagiomnium</i> ツルチョウチンゴケ属		
<i>Plagiomnium cuspidatum</i>	ツボゴケ	2019631
<i>Plagiothecium</i> サナダゴケ属		
<i>Plagiothecium euryphyllum</i>	オオサナダゴケモドキ	2019645 2019667
<i>Pogonatum</i> ニワスギゴケ属		
<i>Pogonatum inflexum</i>	コスギゴケ	2019665
<i>Pohlia</i> ヘチマゴケ属		
<i>Pohlia annotina</i>	キヘチマゴケ	2019649
<i>Polytrichastrum</i> ミヤマスギゴケ属		
<i>Polytrichastrum formosum</i>	オオスギゴケ	2020013 2020016
<i>Polytrichum</i> スギゴケ属		
<i>Polytrichum commune</i>	ウマスギゴケ	2019668 2019806 2019807
<i>P. piliferum</i>	ハリスギゴケ	2019636 2020022
<i>Pylaisiadelphina</i> コモチイトゴケ属		
<i>Pylaisiadelphina tenuirostris</i>	コモチイトゴケ	2019638
<i>P. tristoviridis</i>	イトハイゴケ	2020021
<i>Racomitrium</i> シモフリゴケ属		
<i>Racomitrium lanuginosum</i>	シモフリゴケ	2019653 2019804 2019805

学名	和名	標本番号
<i>Rhytidiadelphus</i> フサゴケ属 <i>Rhytidiadelphus squarrosus</i>	フサゴケ	2019652
<i>Schistidium</i> シズミギボウシゴケ属 <i>Schistidium liliputanum</i>	コメバギボウシゴケ	2019629
<i>Schistostega</i> ヒカリゴケ属 <i>Schistostega pennata</i>	ヒカリゴケ	現地確認
<i>Tetraphis</i> ヨツバゴケ属 <i>Tetraphis pellucida</i>	ヨツバゴケ	2019648 2020011 2020019
<i>Tortella</i> ヨリイトゴケ属 <i>Tortella japonica</i>	コネジレゴケ	2019657
MARCHANTIOPHYTA ゼニゴケ植物門(タイ類)		
<i>Calypogeia</i> ツキヌキゴケ属 <i>Calypogeia neesiana</i> subsp. <i>subalpina</i>	タカネツキヌキゴケ	2020009
<i>Cephalozia</i> ヤバネゴケ属 <i>Cephalozia otaruensis</i>	オタルヤバネゴケ	2019664 2019666
<i>Diplophyllum</i> シロコオイゴケ属 <i>Diplophyllum taxifolium</i>	ホソバコオイゴケ	2019663
<i>Douinia</i> コオイゴケ属 <i>Douinia plicata</i>	コオイゴケ	2019656
<i>Gymnomitrium</i> サキジロゴケ属 <i>Gymnomitrium coralloioides</i>	サンゴサキジロゴケ	2019662
<i>Kurzia</i> コスギバゴケ属 <i>Kurzia makinoana</i>	コスギバゴケ	2019647 2019658 2019659
<i>Marsupella</i> ミゾゴケ属 <i>Marsupella emarginata</i> subsp. <i>tubulosa</i> var. <i>tubulosa</i>	タカネミゾゴケ	2020006 2020027 2020028
<i>Mylia</i> カタウロコゴケ属 <i>Mylia taylorii</i> <i>M. verrucosa</i>	カタウロコゴケ イボカタウロコゴケ	2020008 2019639
<i>Odontoschisma</i> クチキゴケ属 <i>Odontoschisma grosseverrucosum</i>	フチドリイボクチキゴケ	2020018
<i>Plagiochila</i> ハネゴケ属 <i>Plagiochila porelloides</i>	ヒメハネゴケ	2020007
<i>Scapania</i> ヒシヤクゴケ属 <i>Scapania parvireta</i>	コアマヒシヤクゴケ	2019660
<i>Solenostoma</i> ソロイゴケ属 <i>Solenostoma infusum</i> var. <i>ovicalyx</i>	タカネツボミゴケ	2019654

引用文献

出口博則・井上侑哉・坪田博美・H. ベドナレク-オヒラ・R. オヒラ (2020) : 日本産シモフリゴケ類の分類の現況. 蘚苔類研究, 12 (3) : 85-86.

片桐知之・古木達郎 (2018) 日本産タイ類・ツノゴケ類チェックリスト, 2018.Hattoria 9 : 53-102.

Suzuki, T (2016) A Revised New Catalog of the Mosses of Japan. Hattoria 7: 9-223.

(中澤 和則)

3 動物

(1) 哺乳類

ア 調査目的

上信越高原国立公園の第1種～第3種特別地域に指定されている標高1200m～1700mの浅間山北麓の一带に生息する哺乳類の状況を把握することとした。

イ 調査月日及び調査範囲

2023年9月2日・3日：すずらん坂公園周辺、9月10・11・12日：熔岩樹型群、8月25・26日：シャクナゲ園、10月4・5日：群馬坂林道、10月24・25日：東泉沢、11月4・5日：大堀沢と青山ストックヤード周辺にて行い、コウモリ類は超音波の収集及びネズミ類の生息データの収集に務めた。

ウ 調査方法

(ア) 目視・フィールドサイン法

主に哺乳動物の活動時間帯である夜間に調査敷地内を踏査し、目視により確認及びコウモリ類には手網による捕獲も行った。また、日中は糞や爪痕等のフィールドサインを収集し、記録した。

(イ) トラップ法

ネズミ・モグラ類を対象として、50台のシャーマントラップを約10m間隔に設置した。

(ウ) 超音波測定法

夕方から夜間に飛翔しているコウモリ類の発言する超音波をバットディテクターで測定し、周波数帯からコウモリ類の種の判定を行った。なお、測定に使用したバットディテクターの機種はUltra Sound Advice社製 (MINI-3)、周波数はMINI-3のサンプル・データを基準とした。

エ 調査結果

今年度確認された生息種は6目11科18種であった。コウモリ類の周波数ピーク時に該当する種類はおおむね下記のように区分され、調査区域全域において超音波を感知することができたことにより、コウモリ類の生息密度は高いと推定できる。

学名及び種の配列は、環境庁編 (1993) を基準とした。

生息種及び確認状況 (表3-1) を示す3次メッシュは、No.5438-53- [18・19], -54- [10・11・20・21・30・31・40・41・42・51・52・53・72] である。

表3-1 生息種及び確認状況

種名 \ 3次メッシュNo.	18	19	10	11	20	21	30	31	40	41	42	51	52	53	72
ヒメヒミズ	●		●												
ヒミズ	●		●	●		●		●							
キクガシラコウモリ		◎		◎				◎			◎				
ヒメホオヒゲコウモリ															◎
モモジロコウモリ			◎								◎				◎
ヤマコウモリ	◎				◎										◎
ヒナコウモリ		◎	◎	◎	◎			◎							◎
ウサギコウモリ	◎	◎													◎
テングコウモリ															◎
ノウサギ	○	○	○												○
ヒメネズミ	●			●				●			●				
アカネズミ	●	●		●				●			●				
ツキノワグマ											○				
タヌキ		○		○				○			○				
ニホンイタチ			○	○		○		○			○			○	○
イノシシ			○	○		○		○							○
シカ	○			○				○							○
カモシカ	○														○

確認方法 ●：捕獲 ○：目視 ◎：超音波

目録 ( ) は標高 (m) を示す。

- Talpidae モグラ科
Dymecodon pilirostris ヒメヒミズ
26-VIII-2023 くらやみ沢橋 (1400)
Urotrichus Talpoides ヒミズ
26-VIII-2023 群馬坂林道 (1400)
Rhinolophidae キクガシラコモリ科
Rhinolophus ferrumeguinum キクガシラコウモリ
11-IX-2023 熔岩樹型 (1306)
Vespertilionidae ヒナコウモリ科
Myotis ironirovi ヒメホオヒゲコウモリ
3-IX-2023 青山ストックヤード (1130)
M.macrodactylus モモジロコウモリ
10-IX-2023 熔岩樹型 (1306)
Nyctalus aviator ヤマコウモリ
24-X-2023 シャクナゲ園 (1500)
Vespertilio Superans ヒナコウモリ
24-X-2023 シャクナゲ園 (1500)
Plecotus auritus ウサギコウモリ
4-X-2023 群馬坂林道 (1400)
Murina leucogaster テングコウモリ
3-IX-2023 すずらん坂付近 (1200)
Leporidae ウサギ科
Lepus brachyurus ノウサギ
2-IX-2023 すずらん坂付近 (1200)
Muridae ネズミ科
11-IX-2023 大堀沢西 (1400)
A.speciosus アカネズミ
11-IX-2023 熔岩樹型 (1306)
Ursidae クマ科
Ursus thibetanus ツキノワグマ
10-IX-2023 大堀沢西 (1400)
Canidae イヌ科
Nyctereutes procyonoides タヌキ
24-X-2023 シャクナゲ園 (1500)
Mustelidae イタチ科
Mustela itatsi ニホンイタチ
25-X-2023 東泉沢 (1467)
Suidae イノシシ科
Sus scrofa イノシシ
12-IX-2023 熔岩樹型 (1306)
Cervidae シカ科
Cervus nippon ニホンジカ
26-VIII-2023 群馬坂林道 (1400)
Bovidae ウシ科
Capricornis crispus カモシカ
3-IX-2023 青山ストックヤード (1130)

引用文献

環境庁編 (1993) 日本産野生生物目録. 脊椎動物編. 80pp. (財) 自然環境研究センター.

(夏目 道生)

(2) 爬虫類・両生類

ア 調査目的

浅間山北麓地域は度々の火山活動による入山規制や水域が少ないこと等により、爬虫類、両生類の調査記録は少なく、良好な自然環境を有する地域学術調査では浅間山から離れた嬭恋村鎌原の水田地帯でのみ5種の無尾類の生息が記録されている (富岡・布施 1979)。今回の調査は鬼押出し

岩内で水域がなく爬虫類や両生類が生息しにくいと思われる区域での生息確認を目的とした。

イ 調査日及び調査方法

浅間山北麓鬼押し岩内の調査を2023年4月21日（浅間園）、植物調査に同行し7月7日（浅間園）、9月5日（鬼押し園）に実施した。鬼押し岩内の遊歩道及びその周辺の裸地や森林内において捕獲網を準備し目視で日中調査を行った。

ウ 調査結果

爬虫類では、ヒガシニホントカゲを浅間園遊歩道で4月21日と7月7日に確認したが、捕獲し計測はできなかった。両生類は確認できなかった。鬼押し園遊歩道では爬虫類、両生類ともに確認できなかった。

目録

爬虫類

SQUAMATA 有鱗目

Scincidae トカゲ科

Plestiodon finitimus ヒガシニホントカゲ

引用文献

富岡克寛・布施英明（1979）野生動物（浅間山地域）. 良好な自然環境を有する地域学術調査報告書, 5: 82-95. 群馬県林務部林業経営課（自然保護対策室）.

（中澤 和則）

(3) 昆虫類

ア トンボ目

浅間山北麓地域について、本研究会では1978年に調査がなされているが、トンボ目の記録はない（久保ほか 1979）。また近くにある県自然環境保全地域（王領地の森）において、2002年の調査で5種（イトトンボの1種、オニヤンマ、シオカラトンボ、ウスバキトンボ、アキアカネ）が記録されている（角田ほか 2004）。

このように周辺地域を含めても情報は不十分であることから本地域のトンボ目の生息状況確認を目的に調査を行った。

（ア）調査地と調査日

調査は6月から9月にかけて10回、浅間高原シャクナゲ園周辺は岡崎が2023年6月5日、7月16日（午後）、8月3日、9月2日、9月28日の5日間、荒井が2023年6月17日、7月16日（午前）の2日間調査し、浅間山ビジターセンター周辺は2023年6月17日、7月20日、8月22日（いずれも岡崎）の3日間調査した。天候は2023年6月5日、8月22日、9月2日は曇～薄日、それ以外は晴であった。

（イ）調査方法

調査地を踏査し、成虫は主に目視により種を同定した。目視で同定困難な種については、捕虫網による捕獲およびカメラの撮影画像により種を同定した。また、Dフレームネット等の網による幼虫の採集も試みた。

（ウ）調査結果

今回の調査では、1科1種（止水性1種）、トンボ科アキアカネしか確認できなかった。

浅間高原シャクナゲ園周辺は、シャクナゲ園と林道を調査した。本調査地域はトンボ目の生息可能な水域が乏しい。シャクナゲ園の西に延びる林道沿いに小武沢、泉沢が横断しているが、いずれも調査期間中水の流れを確認できなかった。このため調査地域外だが西に隣接の大沢川を参考に調査した。ここは標高的にはシャクナゲ園とほぼ同じであり、調査期間中も水が流れており産卵や幼虫の調査を試みた。結果、アキアカネ、ウスバキトンボ（いずれも止水性）を確認することができたが、産卵、幼虫は確認できなかった。

浅間山ビジターセンター周辺は、遊歩道、サイクリングロード、鬼押し園等を調査した。こちらもシャクナゲ園同様、水域がないため、確認できたのは、アキアカネだけだった。

今回確認したアキアカネは本調査地域内には水域がないため、他の地域から飛来してきたと考えられる。また大沢川で確認したウスバキトンボについて、「成虫は春～秋にかけて全国各地でみられ、一時的な発生を繰り返すが、ほとんどの地域では越冬できず死滅している」（尾園ほか2012）ことから本種も調査区域外から飛来したと考えられる。

目録

ODONATA トンボ目

※①浅間高原シャクナゲ園周辺、②浅間山ビジターセンター周辺 Oは岡崎太郎、Aは荒井堅一が確認

Libellulidae トンボ科

Sympetrum frequens アキアカネ

16-VII-2023午前50exs. ①(O), 16-VII-2023午後50exs. ①(A), 20-VII-2023 50exs. ②(O), 3-VIII-2023 100exs. ①(O), 22-VIII-2023 50exs. ②(O), 2-IX-2023 50exs. ①(O), 28-IX-2023 10exs. ①(O)

(参考) 調査範囲の西に隣接の大沢川の記録

Libellulidae トンボ科

Sympetrum frequens アキアカネ

16-VII-2023 100exs. (O), 3-VIII-2023 100exs. (O), 2-IX-2023 100exs. (O), 28-IX-2023 30exs. (O)

Pantala flavescens ウスバキトンボ

2-IX-2023 50exs. (O)

引用文献

久保誠二・沢口宏・片野光一・須藤志成幸・富岡克寛・布施英明（1979）浅間山地域、良好な自然環境を有する地域学術調査報告書，5：73-96. 群馬県林務部林業経営課.

尾園 暁・川島逸郎・二橋亮（2012）ネイチャーガイド 日本のトンボ. 532pp. 文一総合出版.
角田寛子・矢島 博・大森威宏・増田和明・綿貫 攻・卯木達郎・大森武昭・金井賢一郎・廣瀬文男・布施英明（2004）王領地の森（県自然環境保全地域）、良好な自然環境を有する地域学術調査報告，30：405-426. 群馬県自然環境課.

（岡崎 太郎・荒井 堅一）

イ バッタ目・ハエ目・ハチ目ほか

（ア）調査目的

浅間山北麓における昆虫類の記録は少なく、この地域に含まれる群馬県自然環境保全地域である王領地の森における2002年の調査ではトンボ目5種、バッタ目3種、カメムシ目6種、コウチュウ目9種、ハチ目2種、シリアゲムシ目2種、ハエ目4種、トビケラ目1種、チョウ目27種が記録されている（布施 2004）。このうちバッタ目はカマドウマ科マダラカマドウマ、キリギリス科ヤブキリ、ヒシバッタ科ヒシバッタ（ハラヒシバッタ？）であり、ハチ目はスズメバチ科キイロスズメバチ、ミツバチ科クマバチ（キムネクマバチ）、ハエ目ではムシキアブ科ハタケヤマヒゲボソムシヒキ、ハナアブ科クロハナアブおよびナミハナアブ、ショウジョウバエ科オオメマトイが記録されているが、ヒシバッタ、クロハナアブ、オオメマトイに関しては同定に疑問がある。

また、小暮（1985）がまとめた群馬県のアリ類目録では、シワクシケアリ、アシナガアリ、クロオオアリの3種が浅間山鬼押出しから記録されている。

浅間山北麓地域における昆虫相の解明は不十分であり、今回、基礎資料を得る目的でバッタ目、ハエ目およびハチ目等について調査を行った。

（イ）調査日および調査方法

2023年6月19日、9月19日に調査を行った。天候は6月19日、9月19日ともに晴であった。調査は旧浅間火山博物館周辺（6月19日、9月19日）および鬼押出し園（6月19日）で行った。調査方法は主に捕虫網を使った見つけ採り法やスウィーピング法で行い、アリ類については地面や葉上を歩いている個体などを採集した。採集した昆虫類は標本にして実体顕微鏡下で細部の確認し、同定を行った。

（ウ）結果

今回の調査によりバッタ目ではコオロギ科2種、ヒシバッタ科1種、バッタ科2種の計3科5種、ハサミムシ目1科1種、ハエ目ではムシヒキアブ科1種、ハナアブ科5種の計2科6種、ハチ目ではセイボウ科1種、アリ科4種、アナバチ科1種、スズメバチ科1種の計4科7種が確認された。

確認された種の中で絶滅危惧種などの希少種をはじめ、本調査地域における特徴的な種は確認できなかった。

バッタ目・ハサミムシ目・ハエ目・ハチ目 目録

ORTHOPTERA バッタ目

Gryllidae コオロギ科

Dianemobius nigrofasciatus マダラスズ 2♂1♀, 19-IX-2023

Oecanthus longicauda カンタン 2♂1♀, 19-IX-2023

Tetrigidae ヒシバッタ科

Tetrix japonica ハラヒシバッタ 1♀, 19-VI-2023

Acrididae バッタ科

Glyptobothrus maritimus maritimus ヒナバッタ 4♂, 19-IX-2023

Mongolotettix japonicus ナキイナゴ 4♂, 19-V-2023

DERMAPTERA ハサミムシ目

Forficulidae クギヌキハサミムシ科

Forficula mikado キバネハサミムシ 1ex., 19-IX-2023

DIPTERA ハエ目

Asilidae ムシキアブ科

Choerades nigrovittata クロスジイシアブ 1♂, 19-IX-2023

Syrphidae ハナアブ科

Eupeodes bucculatus ナミホシヒラタアブ 1♀, 19-VI-2023 (鬼押し園)

Parasyrphus punctulatus クチグロヒラタアブ 1♂, 19-IX-2023

Sphaerophoria macrogaster ホソヒメヒラタアブ 1♂, 19-VI-2023

Syrphus torvus ケヒラタアブ 1♀, 19-VI-2023 (鬼押し園)

Eristalis tenax ナミハナアブ 1♀, 19-VI-2023; 1♀, 19-VI-2023 (鬼押し園)

HYMENOPTERA ハチ目

Chrysididae セイボウ科

Chrysis ignita リンネセイボウ 1ex., 19-VI-2023 (鬼押し園)

Formicidae アリ科

Formica japonica クロヤマアリ 3ex., 19-VI-2023; 1ex., 19-VI-2023 (鬼押し園); 1ex., 19-IX-2023

Camponotus japonicus クロオオアリ 2exs., 19-VI-2023; 4exs., 19-VI-2023 (鬼押し園); 1ex., 19-IX-2023

C. obscuripes ムネアカオオアリ 1ex., 19-VI-2023 (鬼押し園)

Lasius japonicus トビイロケアリ 2exs., 19-VI-2023

Sphecidae アナバチ科

Ammophila infesta ヤマジガバチ 2exs., 19-VI-2023 (鬼押し園)

Vespidae スズメバチ科

Symmorphus foveolatus ハラナガハムシドロバチ 2exs., 19-VI-2023 (鬼押し園)

引用文献

小暮 保 (1985) 群馬県のアリ類. 群馬県動物誌, 389-401. 群馬県.

布施英明 (2004) 昆虫類 (王領地の森 (県自然環境保全地域)). 良好な自然環境を有する地域学術調査報告書, 30: 422-425. 群馬県自然環境課.

(金杉 隆雄)

4 保全（保護）の現状

(1) 調査結果の概要

ア 植物

植生調査は、浅間園の遊歩道とスカイロックトレッキングコースに沿って22カ所、鬼出し園の遊歩道沿いで13カ所、嬭恋村大笹の東泉沢で1カ所の計36カ所の植分で実施し、得られた植生データから植物社会学的な植生単位の抽出を行った。植物相は、植生調査実施地に加え、嬭恋村鎌原字藤原の特別天然記念物浅間山溶岩樹型指定域で調査を行った。なお、浅間園地内の植生はほぼ手付かずであるが、鬼押し出し園の遊歩道沿いでは景観や眺望を損ねる低木や草本の伐採、刈り取りが行われている。概要は以下のとおりである。

- 1 植生調査の結果、2群集17群落の基本的植生単位が区分された。
  - 2 確認された維管束植物は、70科200属289種2亜種8変種1品種1雑種（301種内分類群）である。これらには7種の県や国指定の絶滅危惧種が含まれる。
  - 3 確認されたコケ植物は、マゴケ植物門が34属40種、ゼニゴケ植物門が12属13種の計46属53種である。
  - 4 鬼押し出し溶岩上の土壌形成が未だに進まないところには、シモフリゴケ群落、ハイイロキゴケ群落、地衣類のハナゴケ群落がみられる。
  - 5 溶岩地形の立地では、遊歩道沿いに小面積のコメススキ群落やウシノケグサ群落、グンバイツル群落などがあるのみで草本群落は未発達である。
  - 6 緩傾斜地の凹地や溶岩の隙間などに土壌が堆積したところではチョウジコメツツジ群集、ヒカゲツツジ群落も成立している。鬼押し出し園では、土壌堆積地自体が少ないためミヤマヤシャブシ、アカマツ、ヒメコマツ、カラマツ、ノリウツギなどの低木は谷間や崖上の転石地以外は未だ疎らである。
  - 7 溶岩上の割れ目や隙間、テラス状地の薄い土壌しかないところや林縁部、標高1700mの火山荒原などには、コメバツガザクラミネズオウ群集、ツガザクラ群落、ガンコウラン群落、コケモモ群落、クロマメノキ群落などがみられる。一部溶岩上にはイワヒゲ群落が生育する。
  - 8 標高1450m以上の小滝火砕流上にはダケカンバ林がみられ、1550m付近になるとカラマツが優占する群落が多くなる。溶岩末端崖下の広い尾根状地や標高1400m以下の吾妻火砕流上にはアカマツの高木林がみられ、一部にはミズナラ林（未調査）が広がる。
  - 9 標高1700m付近の前掛山溶岩上には、ガンコウランミヤマヤシャブシ群落やダケカンバが混生するサビバナナカマド群落も成立し、その林縁部の火山砂礫地には密生したクロマメノキ群落やガンコウラン群落がみられる。大きな噴石が地表に落下、衝突した荒原では未だにカラマツの低木が疎らに生える程度である。
  - 10 嬭恋村大笹を流れる東泉沢（標高1150m付近）の流水中にバイカモ群落がみられた。
- 以上、調査結果の概要を述べたが、本調査は2年計画で実施されるため、噴火史に因る溶岩流や火砕流との考察は2024年度の調査データを含めて総合的に行う。

イ 動物

哺乳類、爬虫類・両生類、昆虫類（トンボ目・バッタ目、ハサミムシ目、ハエ目、ハチ目）の調査を実施した。

哺乳類は6目11科18種が確認された。

爬虫類は1目1科1種が確認されたが、両生類は確認できなかった。

昆虫類はトンボ目ではトンボ科1種、バッタ目ではコオロギ科2種、ヒシバッタ科1種、バッタ科2種の計3科5種、ハサミムシ目では1科1種、ハエ目ではムシヒキアブ科1種、ハナアブ科5種の計2科6種、ハチ目ではセイボウ科1種、アリ科4種、アナバチ科1種、スズメバチ科1種の計4科7種が確認された。

(2) 保全（保護）の現状

浅間山北麓地域一帯は、上信越高原国立公園に指定されており、浅間山北麓ジオパークとして

2016年9月に日本ジオパークへの認定を受けている。一部では浅間園や鬼押し出し園、シャクナゲ園など公園整備が成されて多くの観光客を迎え入れているが、大半は起伏の激しい荒涼とした溶岩流や火砕流に覆われるため、未だに人々が入り込む余地は限られている。また、浅間山が活発な火山活動を続けているため、心理的にも入山が妨げられているものと思われる。噴火時の避難シェルターについても各公園内や登山路の一部に設置されているだけであり、それ以外の地域に人々が入り込むことを想定していないことがわかる。この点で浅間山北麓地域一帯は、新たな噴火災害が生じない限り、今後も1783年（天明3年）の大爆発以降の乾性一次遷移が進む手付かずの自然が残されていくものと思われる。

一方で、2012～2026年まで国土交通省による砂防事業が北麓と併せて長野県側南麓の水系で行われており、山体を覆う浸食に脆弱な火山噴出物の泥流や新たな噴火によって発生する災害に備えている。また、シャクナゲ園と浅間園を起点に外輪山を経て既存の登山ルートと結ぶ計画が進行中である。しかし、構想されたルート上には貴重種や希少種、保護すべき群落などがあることが明らかにされており（大平ほか 2022, 2023）、最終的なルート設定にはそれらを踏まえた配慮が求められる。計画の進捗状況については把握できていないが、環境省や浅間山ジオパーク推進協議会をはじめ町村観光振興及び防災関連機関のほか、動植物や植生、地形地質等の学識経験者を交えた現地踏査を経て慎重に決められることが望ましいと考える。

今回の調査で、国及び県指定の絶滅危惧種であるカラフトイバラやヒメイズイ、イトハナビテンツキなど7種が確認された。多くは浅間園や鬼押し出し園内等に自生し法的にも規制されているが、盗掘の懸念は払拭されない。国立公園の積極的利用と観光客の呼び込み拡大の一方で、現地での啓発活動や教育の機会を設けることが一層求められる。また、保全（保護）のためには、地形・地質や植生、動植物相などの実態を詳らかにする必要がある。何をどのように保全・保護するのか、その意義や手法を検討する上でも基礎資料は重要である。今後の火山活動により現存植生が損なわれることは十分に考えられるが、自然現象によって失われることと人為による消失は同一ではない。後者についてできるだけ避けるよう最大限配慮すべきである。

（吉井 広始）